

In studieverband
 Buiten studieverband

CYVE: Cytarabine + Etoposide
Soussain
(bij kuur 2 stamcelmobilisatie)

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	339966A 339966B	chemo niet gem chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: recidief Primair CNS Lymfoom Cyclusduur: 28 dagen (stamcel mobilisatie na kuur 2) Totaal: 2 cycli gevolgd door TBC transplantatie schema (4-6 weken naar start 2 ^{de} CYVE) Bron: Soussain; JCO 2008 ;vol 26 (15) : 2512-2518		Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 0		plaatsen CVK					
		Dag 1	20.00 - 08.00	CYTARABINE totaal 1dd 50 mg/m ² in 500 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 12 uur	i.v.mg			
		Dag 2	09.00-11.00	ETOPOSIDE ≤ 60 jr Totaal 1 dd 200 mg/m ² > 60 jaar Totaal 1 dd 150 mg/m ² In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 2 uur	i.v.mg			
			12.00-15.00	CYTARABINE Totaal 1dd 2000 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
			20.00-08.00	CYTARABINE 50 mg/m ² inlooptijd: 12 uur	i.v.mg			
		Dag 3	09.00-11.00	ETOPOSIDE ≤ 60 jr Totaal 1 dd 200 mg/m ² > 60 jaar Totaal 1 dd 150 mg/m ² In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 2 uur	i.v.mg			
			12.00-15.00	CYTARABINE 2000 mg/m ² inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
			20.00-08.00	CYTARABINE 50 mg/m ² inlooptijd: 12 uur	i.v.mg			

CYVE: HD CYTARABINE Etoposide (mobilisatieschema)

		Dag 4	09.00-11.00	ETOPOSIDE ≤ 60 jr Totaal 1 dd 200 mg/m ² > 60 jaar Totaal 1 dd 150 mg/m ² In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 2 uur	i.v.mg			
			12.00-15.00	CYTARABINE 2000 mg/m ² inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
			20.00-08.00	CYTARABINE 50 mg/m ² inlooptijd: 12 uur	i.v.mg			
		Dag 5	09.00-11.00	ETOPOSIDE ≤ 60 jr Totaal 1 dd 200 mg/m ² > 60 jaar Totaal 1 dd 150 mg/m ² In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 2 uur					
			12.00-15.00	CYTARABINE 2000 mg/m ² inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
			20.00-08.00	CYTARABINE 50 mg/m ² inlooptijd: 12 uur	i.v.mg			
	ja	Start dag 7	21.00	Filgrastim Indien stamcelmobilisatie	s.c.	< 80 kg: 300 µg ≥ 80 kg: 480 µg			

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: 1l Gluc2.5%/NaCl0,45% per 24 uur
		Dag 1 t/m 6: Ondansetron (Zofran)2dd 8 mg/i.v.
		Bij hoge tumorload: Allopurinol 1 x 300 mg/p.o./dd
		Dag1: Hypromellose 0,3% oogdruppels 6dd.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		G-CSF start dag 7 e.v. indien stamcelmobilisatie
		Bloedproducten bestralen.

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels.
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 5 dagen na de laatste gift Etoposide worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositiscore bijhouden.
- Mondverzorging

ACHTERGRONDINFORMATIE

Cytarabine

Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C, Depocyt

- Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metabolieten.
- Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, huidrash, met pijn en blaarvorming vooral van handen en voeten, afhankelijk van de hoogte van de dosering en toedieningswijze leverfunctiestoornissen zelden koorts, stomatitis, haaruitval ,anorexie, diarree
bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels noodzakelijk)

Etoposide

Synoniem: EPEG, Toposin, Vepesid, VP16, VP16213

- Eigenschappen: Cytostaticum, Topoisomerase-2-remmer
- Bijwerkingen: anafylactische reacties, zoals koorts, blozen, tachycardie, bronchospasmen, hypotensie infecties, anorexie