

In studieverband :.....

Buiten studieverband

AZACITIDINE

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: MDS/CMML/AML Cyclusduur: 4 weken Totaal: 6, waarna bij goede respons tot progressie Bron:	Afspraakcodes DC: AZACITIDINE 0:30 min	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

Kuurnummer:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1 t/m 7	ONDANSETRON	p.o.	8 mg	recept arts thuis innemen, check recept		
	1	AZACITIDINE 75 mg/m ²	sc	... mg	<i>a,b,c,d,e</i> : MUST		
	2	AZACITIDINE 75 mg/m ²	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	3	AZACITIDINE 75 mg/m ²	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	4	AZACITIDINE 75 mg/m ²	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	5	AZACITIDINE 75 mg/m ²	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	6	AZACITIDINE 75 mg/m ²	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	7	AZACITIDINE 75 mg/m ²	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		

Verpleegkundige toedien-instructies : zie volgende pagina

Verpleegkundige toedien-instructies :

- *a.* De Azacitidine wordt rond het middaguur geleverd op het INDC in een koeltas. De Azacitidine wordt direct in de koelkast geplaatst en daar tot aan de toediening bewaard.
- *b.* **Azacitidine is ongekoued na bereiding 45 min. houdbaar.**
- *c.* Rol vóór toediening de spuit krachtig tussen handen heen en weer om homogene suspensie te verkrijgen, de oplossing heeft neiging tot neerzakken.
- *d.* Noteer injectieplaats in het zorgdossier.
- *e.* Screen dag 1 op ondervoeding: neem de MUST af.
- Gereconstitueerd Azacitidine moet diep-subcutaan in de bovenarm, het dijbeen of de buik worden geïnjecteerd met behulp van een naald van 25 gauge (Een oranje naald voor subcutane toediening).
- Om te voorkomen dat de injectie in de spierlaag terecht komt, dient de naald ingebracht te worden onder een hoek van 45 tot 90 graden afhankelijk van de hoeveelheid vetweefsel en de elasticiteit van de huid.
- Om huidirritatie te voorkomen, dient er geen medicijn in de naald aanwezig te zijn. Verwijder de lucht in de naald niet voorafgaand aan de injectie.
- Doses groter dan 4 ml moeten op twee afzonderlijke plaatsen worden geïnjecteerd.
- De suspensie langzaam injecteren.
- De naald na het inspuiten van de Vidaza pas na enkele seconden terugtrekken om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
- De injectieplaatsen moeten worden afgewisseld. Nieuwe injecties moeten op een afstand van ten minste 2,5 cm van een vorige injectieplaats worden toegediend en nooit in gebieden waar de huid pijnlijk, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont.
- Indien de patiënt pijn heeft tijdens het geven van de injectie kan 15 minuten voor de injectie niet-steroidale gel (NSAID) op de injectieplaats worden aangebracht. De arts of nurse practitioner een recept laten schrijven. Voltarengel is een drogisterij-artikel en moet de patiënt zelf kopen. Hier is geen recept voor nodig. Emla is ook een optie, overleg even met de arts/N.P.
- Gevoelige en rode injectieplaatsen kunnen driemaal daags worden behandeld met NSAID gel.
- Indien de injectieplaats jeukt, kan een antihistaminecrème worden toegepast of een milde corticosteroiden crème.
- Azacitidine mag niet thuis worden toegediend!

Achtergrondinformatie Azacitidine

Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Behandeling van acute myeloïde leukemie (AML), myelodysplastisch syndroom (MDS).
- Indicatie: Azacitidine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie, met:
 - intermediair II en hoog risico myelodysplastische syndromen (MDS) volgens het IPSS,
 - chronische myelomonocyttaire leukemie (CMML) met 10-29% beenmergblasten zonder myeloproliferatieve aandoening,
 - acute myeloïde leukemie (AML) met 20-30% blasten en multilineaire dysplasie volgens de indeling van de WHO.
- Evaluatie: elke 4 weken policontrol.

Informatie over het geneesmiddel:

- Azacitidine: antineoplastica, pyrimidine-analogen met een hypomethylerende werking, d.w.z. dat celdelingremmende genen worden gestimuleerd. Het middel is cytotoxisch.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Check of Ondansetron is ingenomen. Zo niet, een tablet geven en patiënt instrueren.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Ondansetron 8 mg per os, op de ochtend voor de injectie.