

# Moederprotocol IHEM NHL R-BENDA



Naam Behandelplan:	IHEM NHL R-BENDA	
Synoniemen:	Bendamustine, Rituximab	
Indicatie:	Non-Hodgkin Lymfoom (NHL)	
Cyclus duur:	28 dagen	
Totaal aantal cycli:	6 (maximaal)	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	RITUXBEND1 (kuur 1): 405 minuten RITUXBEND2 (KUUR≥2): 205 minuten BENDAMUSTI (dag 2): 105 minuten	
Facturerings indicatie:	1430, 160, 469	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/snelheid	Dagen/ dag cycli											
				Dag	1	2	3								28
<b>Chemotherapie</b>															
<b>BENDAMUSTINE</b> In 500 ml NaCl 0,9%	90 mg/m <sup>2</sup>	IV	00:30	X	X										
<b>RITUXIMAB</b> 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	04:00 (langzaam) 01:00 (snelle)	X											
<b>Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie</b>															
Ondansetron (1 <sup>e</sup> gift IV)	2xdd 8mg	PO	Max 3 dagen	X	X										
Allopurinol (zo nodig bij hoge tumorload 1 <sup>e</sup> kuur)	1xdd 300mg	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Movicolon (zonodig)	3xdd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Pre- medicatie/ anti-emetica</b>															
ONDANSETRON	8 mg	IV	Bolus	X											
PREDNISOLON	25 mg	IV	Bolus	X											
CLEMASTINE	2 mg	IV	Bolus	X											
PARACETAMOL	1000 mg	PO		X											



**Patiënt informatie:**

- Kuur specifieke bijwerkingen:
  - Roken en het gebruik van Omeprazol kan de plasmaconcentratie van Bendamustine verlagen. Gebruik vermijden.
  - Gebruik ciprofloxacine en fluvoxamine kan de plasmaconcentratie van Bendamustine verhogen.
- Verwachte misselijkheid
- Huid: jeuk en uitslag
- Overgevoeligheid (allergie)
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg vol voldoende vochtinname
- Pijn (hoofdpijn, pijnlijke mond)
- Koorts
- Vermoeidheid
- Bloedingen
- Bloedarmoede, tekort aan witte bloedcellen, tekort aan bloedplaatjes, tekort aan witte bloedcellen
- Excreta: 2 dagen

<b>Afspraakaanvragen</b>															
Cyclus/dag	C0D 1	C1D 1	C1D 2	C1D 15	C2D 1	C2D 2	C3D 1	C3D 2	C4D 1	C4D 2	C5D 1	C5D 2	C6D 1	C6D 2	C6D 52
Arts	X			X	X				X				X		X
Verpleegkundig specialist	X			X			X				X				
Dagcentrum afspraak		X	X			X		X		X		X		X	

<b>Lab</b>						
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D4	C5D1	C6D1
Hematologie	X	X	X	X	X	X
Chemie	X					
Leuko, Hb, Ht, MCV, trombo	X					
Neutro absoluut	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X
Totaal bilirubine	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X
EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X					
EDTA opslag bloedbuis	X					
Serum stolbuis	X					
Streckbuis plasma cf-DNA	X			X		

<b>Beeldvorming/ overig</b>			
Cyclus/ dag	C3/D 21	C6D 42	
CT	X		
PET	X	X	

<b>Zorgverlener communicatieorders</b> (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij transfusie dienen bestraalde bloedproducten te worden voorgeschreven tot 1 jaar na behandeling.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien patiënt &gt;3 maand geleden Rituximab heeft gehad, overleg dan met Verpleegkundig specialist Dagcentrum of snelle schema mag worden gebruikt.</li> <li>• Bij eerdere overgevoeligheidsreacties en/of lymfoomcellen <math>&gt; 5 \times 10^9/l</math> : steeds langzame schema voorschrijven.</li> <li>• Evaluatie: na 1<sup>e</sup> kuur evt. 14 dagen na toediening, control BB en tumorlysis.</li> </ul>
--	--

<b>Verpleegkundige orders</b> (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoeligheidsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab
Algemeen 9	Check of Ondansetron is ingenomen. Zo niet, een tablet een half uur voor het infuus geven

<b>Vitale gegevens</b>						
	RR	Pols	SpO2	AF	Temp	Gewicht
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X			X	

<b>Toegangsweg</b>
Perifeer

<b>Spoedmedicatie</b> Ja
--------------------------