

Moederprotocol IHEM BrAVD



Naam Behandelplan:	IHEM Br-AVD	
Synoniemen:	Brentuximab-vedotin, Doxorubicine, Vinblastine, Dacarbazine	
Indicatie:	Hodgkin lymfoom	
Cyclus duur:	28 dagen	
Totaal aantal cycli:	6	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	225 min	
Facturerings indicatie:	544, 2676	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron	COBRA trial protocol	

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	1	2	3	4	5	15	16	17	18	19			
Chemotherapie																	
DOXORUBICINE (in folie) In 50 – 100 ml NaCl 0,9%	25 mg/m ²	IV	00:15	X						X							
VINBLASTINE In 50 ml NaCl 0,9%	6 mg/m ²	IV	00:15	X						X							
DACARBAZINE In 500 ml NaCl 0,9%	375 mg/m ²	IV	01:00	X						X							
BRENTUXIMAB VEDOTIN In 100 ml NaCl 0.9%	1.2 mg/kg (max 120 mg)	IV	00:30	X						X							
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																	
Ondansetron (1 ^e gift IV)	2xdd 8mg	PO	Max 3 dagen	X	X	X				X	X	X					
Movicolon (bij obstipatie)	1 sachet zo nodig 3xdd	PO															
Allopurinol (bij hoge tumorload 7 dgn)	300mg	PO	1xdd dag 1-7														
Pegfilgrastim	6mg	SC	Eenmalig						X								X
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
ONDANSETRON	8mg	IV	Bolus	X						X							
CLEMASTINE	2mg	IV	Bolus	X						X							
PARACETAMOL	1000mg	PO		X						X							



Moederprotocol IHEM BrAVD

Patiënt informatie:

- Kuur specifieke bijwerkingen:
 - Roodgekleurde urine (Doxorubicine)
 - 1^e 48 uur geen contactlenzen dragen
 - Eet geen pompoelmoes of grapefruit vanwege interactie.
- Haaruitval
- Verwachte misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg vol voldoende vochtinname
- Pijn
- Koorts
- Bloedingen
- Polyneuropathy (zenuwpijn): Vinblastine, brentuximab-vedotin
- Excreta: 6 dagen

Cyclus/dag	C1 D0	C1 D1	C1 D15	C2 D1	C2 D15	C3 D1	C3 D15	C4 D1	C4 D15	C5 D1	C5 D15	C6 D1	C6 D15	
Afspraken														
Arts		X		X		x		x		X		x		
Verpleegkundig specialist	X		X		x		x		x		X		X	
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Cyclus/dag	C1 D0	C1 D1	C1 D15	C2 D1	C2 D15	C3 D1	C3 D15	C4 D1	C4 D15	C5 D1	C5 D15	C6 D1	C6 D15	C6 D36
Laboratoriumonderzoek														
Hematologie	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chemie	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TARC	x			X						X				X
Oncolifes streck buis	X			X										X
Virusserologie	X													

Beeldvorming	
PET/CT	C2 D22 C6 42

Zorgverlener communicatieorders	
Beleid bij neurotoxiciteit	Dosering Vinblastine en brentuximab-vedotin aanpassen bij neurotoxiciteit (zie COBRA protocol pagina 36)
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	<ul style="list-style-type: none"> • Geen uitstel bij neutropenie • Wel uitstel bij febrile neutropenie



Verpleegkundige orders	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver
Toedieninstructies 1	Prik het infuus met een roze naald in een grote vene.
Toedieninstructies 5	Gebruik een lichtwerend systeem voor de Dacarbazine.
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Algemeen 20	Indien complicaties optreden tijdens inlopen: <ul style="list-style-type: none"> - Zet lijn Brentuximab stop - Sluit infuussysteem met NaCl 0,9% aan en zet de lijn open - Laat een collega de specialist en arts assistent waarschuwen - Doe controles: RR, Pols, Temperatuur. Gedurende de rest van de controles a 15 min. Tot 1 uur na het inlopen van het infuus. - Bed in Trendelenburg - In overleg met specialist: indien na enige tijd de klachten verdwijnen of verminderen mag de toediening worden hervat met de helft van de voorgaande infusiesnelheid.

Vitale gegevens						
	RR	Pols	SpO2	AF	temp	gewicht
Eenmalig na vrijgave	X	X			X	

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja