

## IHEM HL BRENTUXIMAB VEDOTIN



Naam Behandelplan:	IHEM HL BRENTUXIMAB VEDOTIN	
Synoniemen:	Brentuximab Vedotin	
Indicatie:	Recidief of therapieresistent Hodgkin Lymfoom	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	16	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur	150 minuten	
Facturerings indicatie:	Afhankelijk van indicatie	
Zorgactiviteit:	339966F	immunotherapie

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli																
				Dag	1															21
<b>Chemotherapie</b>																				
BRENTUXIMAB VEDOTIN 1,8 mg/kg in 100 ml NaCl 0.9%	... mg maximaal 180 mg	IV	00:30	X																
<b>Pre- medicatie/ anti-emetica</b>																				
Paracetamol	1000 mg	PO	Eenmalig	X																
Clemastine	2 mg	IV	Bolus	X																
<b>Thuis in te nemen medicatie</b>																				
Ondansetron	8 mg	PO																		
Movicolon	3 dd zo nodig	PO	Sachet																	

### Patiënt informatie:

- Kuur specifiek;
  - Tumorlysis syndroom, Stevens-Johnsonsyndroom, nier- en leverfunctiestoornissen
- Tekort aan witte bloedcellen
- Diarree/ verstopping/ buikpijn
- Grieperig gevoel/ spierpijn
- Haarveranderingen
- huiduitslag/ jeuk
- Benauwdheid
- Misselijkheid en braken
- Zenuwbeschadigingen (neuropathie)
- Afvallen
- Infuusreacties
- Koorts
- Vermoeidheid
- Excreta: 7 dagen



## IHEM HL BRENTUXIMAB VEDOTIN

Afspraakaanvragen		
Cyclus/dag	C0D1	C1D1 -C16D1
Arts/VS	X	Alternerend Arts/VS bij start nieuwe cyclus.
Verpleegkundig specialist	X	
Dagcentrum afspraak		X

Lab		
Cyclus/dag	C1D1	C2D1 – C16D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X
LDH	X	X
ALAT	X	X
Kreatinine	X	X
Totaal Bilirubine	X	X
Neutro (absoluut)	X	X
Glucose	X	X
OncoLifes ESTA plasma + buffycoat opslag standaard	X	
OncoLifes ESTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X	
OncoLifes serum (stolbuis) opslag -standaard	X	
OncoLifes Streckbuis (plasma cf-DNA) Opslag	X	
TARC Hodgkin lymfoom	X	X

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Algemeen 13	Wees alert op symptomen die mogelijk PML duiden. Overweeg IV hydratatie bij 1 <sup>e</sup> kuur ter preventie van tumor lysis syndroom.

Vitale gegevens meten				
Eenmalig, start na vrijgave	RR	HR	AF	Temp
Vooraf en na 15 min observatie	X	X		X



Beeldvorming/ overig	
PET-scan	Geen standaardafspraken, ter beoordeling hoofdbehandelaar
CT-scan	

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In geval van extravasatie volg docportal en overleg met voorschrijver
Algemeen 20	Complicaties bij Brentuximab
Toedieningsinstructies 6	30 minuten wachten na premedicatie
Toedieningsinstructies 7	Observeer voor 15 minuten op infusie gerelateerde bijwerkingen.
Allergische reactie 1	

Toegangsweg	
Perifeer	

Spoedmedicatie Ja	
-------------------	--