



Naam Behandelplan:	IHEM HL Bv-DHAP
Synoniemen:	Cisplastine, Cytarabine, Brentuximab-Vedotin
Indicatie:	CD20 negatief HL salvage. Recidief Hodgkin
Cyclus duur:	14-21 dagen
Totaal aantal cycli:	3
Toedienlocatie:	Kliniek
Facturerings indicatie:	2402, 2877
Zorgactiviteit:	339966E chemo-immunotherapie
Bron	NVT

Cyclus 1, 2 en 3:

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	0	1	2	3	4	5	6					21	
Chemotherapie																	
CISPLASTINE In NaCl 0,9%	100 mg/m ²	IV	9:00 (24 uur)			X											
CYTARABINE In NaCl 0,9%	2 dd 2000mg/m ²	IV	9:00 (180 min) 21:00 (180 min)				X										
BRENTUXIMAB VEDOTIN In 100 ml NaCl 0.9%	1.2 mg/kg (max 120 mg)	IV	11:00 (30 min)		X												
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																	
Pegfilgrastim	6 mg	SC	injectie							X							
Filgrastim (alleen bij mobilisatie starten op dag 5)	1 x 5µg/kg/dag	SC	Injectie							X	X	X	X	X			
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
Dexamethason	40 mg	IV	00:15		X	X	X	X									
Aprepitant	125 mg	Capsule				X											
Aprepitant	80 mg	Capsule					X										
Ondansetron	2 dd 8mg	IV			X	X	X	X	X	X	X						
Metoclopramide	3 dd 10mg (zo nodig)	IV															
CLEMASTINE	2mg	IV	Bolus		X												
PARACETAMOL	1000mg	PO			X												
Hydratie																	
NaCl 0,9%	500 ml/dag	IV	Continu	Starten om 22:00													
NaCl 0,9% per 1000 ml toegevoegd: 20 mmol kaliumchloride*	5000 ml/ 24 uur	IV	05:00 per 1000 ml	X	X	X	X										
Magnesiumsulfaat	750 mg	IV	Bolus Toevoegen aan infuszak 23:59	X													
Furosemide	3xdd 20 mg	IV	Bolus			X	X	X									

* Hyperhydratie minimaal continueren tot en met dag 3 van de kuur. Stoppen afhankelijk van de nierfunctie na cisplatine. Start 6 uur voor cisplatine infuus.



IHEM HL Bv-DHAP

Patiënt informatie:

- Beenmerg
 - bloedarmoede
 - tekort aan bloedplaatjes
 - tekort aan witte bloedcellen
- Darmen
 - diarree
- Misselijkheid en braken
- Nierfunctiestoornis
- Gehoorafwijkingen
- Huiduitslag en jeuk
- Koorts
- Infecties
- Hoofdpijn
- Infuusreacties
- Polyneuropathy (zenuwpijn): brentuximab-vedotin
- Haarveranderingen
- Krachtsvermindering
- Excreta: Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 7 dagen na de laatste gift Cisplatine worden opgeheven

Afspraakaanvragen						
Cyclus/dag	C1D1	C1D8//11/14	C2D1	C2D8/11/14	C3D1	C3D8/11/14
Verpleegkundig specialist		X		X		X
Opname order	X		X		X	

Lab				
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C2D15	C3D1
Leuko, Hb, Trombo	X	X		X
CRP	X	X		X
Natrium	X	X		X
Kalium	X	X		X
Ureum	X	X		X
Kreatinine	X	X		X
Calcium	X	X		X
Albumine	X	X		X
Fosfaat	X	X		X
Magnesium	X	X		X
ASAT	X	X		X
ALAT	X	X		X
LDH	X	X		X
Alkalische fosfatase	X	X		X
Gamma-GT	X	X		X
Totaal Bilirubine	X	X		X
Type & Screen	X	X		X
Neutro (absoluut)	X	X		X
Glucose	X	X		X
TARC	X	X		X



OncoLifes ESTA plasma + buffycoat opslag standaard	X			
OncoLifes ESTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X			
OncoLifes serum (stolbuis) opslag - standaard	X			
OncoLifes Streckbuis (plasma cf-DNA) Opslag	X		X	
Lab ochtendronde*	X	X		X

*Starten op dag 1. Tot nader order. Natrium, glucose, kalium, magnesium, calcium, albumine, fosfaat, kreatinine.

Beeldvormend onderzoek		
Cyclus/dag	C1D3	C2D15
CT		X
PET		X

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Algemeen 2	Schrijf klinisch pegfilgrastim voor onder orders toevoegen indien patiënt openomen blijft.
Algemeen 3	GEEN pegfilgrastim geven indien stamcelmobilisatie. Neem contact op met verpleegkundige consulent transplantatie voor het aanmaken van het aferese protocol.
Beleid bij neurotoxiciteit	Dosering brentuximab-vedotin aanpassen bij neurotoxiciteit (zie COBRA protocol pagina 36)

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Allergische reacties `1	Observeer op overgevoeligheidsreacties
Algemeen 20	Indien complicaties optreden tijdens inlopen: <ul style="list-style-type: none"> - Zet lijn Brentuximab stop - Sluit infuussysvriestem met NaCl 0,9% aan en zet de lijn open - Laat een collega de specialist en arts assistent waarschuwen - Doe controles: RR, Pols, Temperatuur. Gedurende de rest van de controles a 15 min. Tot 1 uur na het inlopen van het infuus. - Bed in Trendelenburg - In overleg met specialist: indien na enige tijd de klachten verdwijnen of verminderen mag de toediening worden hervat met de helft van de voorgaande infusiesnelheid.
Opstarten Casemanagement	Belt de verpleegkundig specialist (46260) voor het opstarten van casemanagement. Indien patiënt in het weekend gestart met de



	behandeling, de MMA vragen op maandag de bellen.
Extravasatie 1	In geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver
Algemeen 15	Huidverzorging: vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine. Voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
Infuus inbrengen	Perifeer infuus inbrengen
Gewicht meten	2 keer per dag (8:00/20:00)
Afnemen MEWS	Elke dag om 8:00
Mondverzorging	Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging
Neus kweek staphylococcus aureus	Eenmalig afdelingsafname
Keel SDD-kweek	Eenmalig afdelingsafname
Rectum SDD kweek	Eenmalig afdelingsafname
Rectum SDD-kweek	Elke maandag
Keel SDD kweek	Elke maandag

Vitale gegevens			
	Temp	RR	HF
3 dd om 6:00/12:00/20:00	X		

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja