

Moederprotocol IHEM NHL CHOEP-14



Naam Behandelplan:	IHEM NHLB CHOEP-14	
Synoniemen:	Doxorubicine, Vincristine, Cyclofosfamide, Etoposide	
Indicatie:	Chronische Lymfatische Leukemie, Non-Hodgkin Lymfoom,	
Cyclus duur:	14 dagen	
Totaal aantal cycli:	6-8	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	Dag 1: 225 minuten	
Facturerings indicatie:	1430, 160, 469	
Zorgactiviteit:	339966B	chemo-immuno
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	1	2	3	4	5							14	
Chemotherapie																	
DOXORUBICINE (in folie) In 50 – 100 ml NaCl 0,9%	50 mg/m ²	IV	00:15	X													
VINCRIStINE In 50 ml NaCl 0,9%	1,4 mg/m ² max. 2 mg	IV	00:15	X													
ETOPOSIDE (1 ^e gift IV)	100mg/m ²	IV	01:00	X													
	100mg/m ²	PO			X	X											
CYCLOFOSFAMIDE In 100 ml NaCl 0,9%	750 mg/m ²	IV	00:30	X													
PREDNISOLON	100mg	PO	Ochtend	X	X	X	X	X									
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																	
Ondansetron (1 ^e gift IV)	2xdd 8mg	PO	Max 5 dagen	X	X	X											
Movicolon (bij obstipatie)	1 sachet zo nodig 3xdd	PO															
Allopurinol (bij eerste kuur)	1xdd300mg	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Cotrimoxazol	1xdd 1 tablet (480 mg)	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pegfilgrastim	10 mg/ml	SC			X												
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
ONDANSETRON	8 mg	IV	Bolus	X	X	X											
DEXAMETHASON	5 mg	IV	Bolus	X	X	X											



Patiënt informatie:

- Kuur specifieke bijwerkingen:
 - Roodgekleurde urine (Doxorubicine)
 - 1^e 48 uur geen contactlenzen dragen
 - Prednisolon kan stijging in glucosespiegel geven (bij 1^e kuur controle bij de huisarts 2 uur na de lunch).
 - Eet geen pompoelmoes of grapefruit vanwege interactie.
 - Hypotensie en pulmonale klachten bij te snelle toediening (Etoposide).
- Haaruitval
- Verwachte misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg vol voldoende vochtinname
- Pijn
- Koorts
- Bloedingen
- Polyneuropathy (zenuwpijn): Vincristine
- Excreta: 6 dagen

Afspraakaanvragen										
Cyclus/dag	C0D1	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	C8D45
Arts	X		x		X		X		X	X
Verpleegkundig specialist	X			x		x		x		
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X	X	X	

Lab									
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X								
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X								
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X								

Moederprotocol IHEM NHL CHOEP-14



OncoLifeS Streckbuis (plasma cf- DNA) opslag	X			X			
---	---	--	--	---	--	--	--

Beeldvorming/ overig			
Cyclus/ dag	C3D12	C8D42	
PET-Scan	X	X	
CT-scan	X		

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Beleid bij neurotoxiciteit	Dosering Vincristine aanpassen bij neurotoxiciteit.
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	Indien voor het begin van de volgende kuur leukocyten $< 4 \times 10^9/l$ en/ of trombocyten $< 100 \times 10^9/l$ zijn, dan 1 week uitstellen. Indien na 1 week uitstel onvoldoende herstel: dosis aanpassen volgens onderstaand schema.

Leuko $\times 10^9/l$	Trombox $10^9/l$	C	H	O	E	P
> 3	> 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.0 – 3.0	> 100	75 %	75 %	100 %	75 %	100 %
1.0 – 2.0	50 - 100	50 %	50 %	100 %	50 %	100 %
< 1	< 50	0 %	0 %	100 %	0 %	100 %

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver

Toegangsweg
Perifeer