

Moederprotocol IHEM NHLT CHOP21



Naam Behandelplan:	IHEM NHLB CHOP21	
Synoniemen:	Doxorubicine, Vincristine, Cyclofosfamide, Rituximab	
Indicatie:	Non-Hodgkin Lymfomen (NHL), chronische lymfatische leukemie (CLL), Prolymfocytenleukemie, T-cel Non-hodgkin lymfoom, lymfomen van de huid.	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	6-8	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	135 min	
Facturerings indicatie:	1430, 160, 469	
Zorgactiviteit:	339966B	chemo-immuno
	339957Z	Bridging CAR-T
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli										
				Dag	1	2	3	4	5					21
Chemotherapie														
DOXORUBICINE (in folie) In 50 – 100 ml NaCl 0,9%	50 mg/m ²	IV	00:15	X										
VINCRIStINE In 50 ml NaCl 0,9%	1,4 mg/m ² max. 2 mg	IV	00:15	X										
CYCLOFOSFAMIDE In 100 ml NaCl 0,9%	750 mg/m ²	IV	00:30	X										
PREDNISOLON	100mg	PO	Ochtend	X	X	X	X	X						
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Ondansetron (1 ^e gift IV)	2xdd 8mg	PO	Max 3 dagen	X	X									
Movicolon (bij obstipatie)	1 sachet zo nodig 3xdd	PO												
Allopurinol (bij hoge tumorload)	300mg	PO	1xdd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pegfilgrastim	10 mg/ml	SC	Eenmalig (indien nodig)		X									
Pre- medicatie/ anti-emetica														
ONDANSETRON	8mg	IV	Bolus	X										
PREDNISOLON	25mg	IV	Bolus	X										
CLEMAStINE	2mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000mg	PO		X										



Moederprotocol IHEM NHLT CHOP21

Patiënt informatie:

- Kuur specifieke bijwerkingen:
 - Roodgekleurde urine (Doxorubicine)
 - 1^e 48 uur geen contactlenzen dragen
 - Prednisolon kan stijging in glucosespiegel geven (bij 1^e kuur controle bij de huisarts 2 uur na de lunch).
 - Eet geen pompoelmoes of grapefruit vanwege interactie.
- Haaruitval
- Verwachte misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg voor voldoende vochtinname
- Pijn
- Koorts
- Bloedingen
- Neuropathische klachten melden bij de arts.
- Polyneuropathy (zenuwpijn): Vincristine
- Excreta: 6 dagen

Afspraakaanvragen										
Cyclus/dag	C1D0	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	C8D16
Arts	X			X				X		X
Verpleegkundig specialist	X		x		x		X		X	
Dagcentrum afspraak		X	x	x	x	x	x	x	x	

Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X
INR								
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X							
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X							
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X							

Moederprotocol IHEM NHLT CHOP21



OncoLifeS Streckbuis (plasma cf- DNA) opslag	X			X				
---	---	--	--	---	--	--	--	--

Beeldvorming-overig		
Cyclus/ dag	C3/D16	C8/D16
PET-scan	X	X
CT-scan	X	
Lumbaalpunctie*, indien hoge CNS-IPi bij start van elke cyclus		

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij neurotoxiciteit	Dosering Vincristine aanpassen bij neurotoxiciteit.

Leuko x 10 ⁹ /l	Trombox 10 ⁹ /l	C	H	O	P
> 3	> 100	100 %	100 %	100 %	100 %
2.0 – 3.0	> 100	75 %	75 %	100 %	100 %
1.0 – 2.0	50 - 100	50 %	50 %	100 %	100 %
< 1	< 50	0 %	0 %	100 %	100 %

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver

Toegangsweg
Perifeer