

COVID vaccinatie bij patiënten met verminderde stolling

De COVID vaccins moeten in de spier worden toegediend. Het kan niet, zoals bij andere vaccins, onder de huid worden toegediend. Het is gelukkig maar een dunne naald en een klein volume, maar bij een deel van de patiënten met verminderde stolling zijn wel voorzorgsmaatregelen nodig om een spierbloeding te voorkomen.

Bij wie zijn **geen** voorzorgsmaatregelen nodig? Bij patiënten met een stollingswaarde boven de 5% zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig. U kunt zich gewoon laten vaccineren. Op uw behandelplan en uw SOS pasje kunt u zien hoe hoog uw stollingswaarde is.

Bij wie zijn **wel** voorzorgsmaatregelen nodig? Iedereen met hemofilie, ziekte van Von Willebrand of een andere tekort aan stollingsfactor met een stollingswaarde beneden 5% en een deel van de patiënten met bloedplaatjesafwijkingen.

Wat moet ik doen als ik denk dat er voorzorgsmaatregelen nodig zijn?

- Als u de afgelopen periode op de poli bent geweest of binnenkort een afspraak hebt dan bespreken we met u wat nodig is.

- Als u niet op de poli bent geweest, overleg dan met de hemofilieverpleegkundige zodra u een oproep krijgt voor de vaccinatie.

Als u twijfelt, of vragen heeft, overleg dan ook met de hemofilieverpleegkundige. tel: 050-3619393
Vaccinatie moet niet uitgesteld worden vanwege uw stollingsstoornis!