

In studieverband
 Buiten studieverband

DACTINOMYCINE, AML NPMmut

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: AML met gemuteerde Nucleofosmine (NPMmut) Cyclusduur: ≥ 21 Dagen Totaal: 6 Cycli Bron: Falini et al. Dactinomycin in NPM1-Mutated Acute Myeloid Leukemia. NEJM. 2015;373:1180-1182.	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen: CVK alleen bij kuur 1

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		opname		plaatsen CVK (alleen bij eerste kuur)					
		Dag 1	09.00-09.15	DACTINOMYCINE 12.5 µg/Kg in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 15 min <i>Let op artsenverklaring nodig!</i>	i.v.µg			
		Dag 2	09.00-09.15	DACTINOMYCINE 12.5 µg/Kg	i.v.µg			
		Dag 3	09.00-09.15	DACTINOMYCINE 12.5 µg/Kg	i.v.µg			
		Dag 4	09.00-09.15	DACTINOMYCINE 12.5 µg/Kg	i.v.µg			
		Dag 5	09.00-09.	DACTINOMYCINE 12.5 µg/Kg	i.v.µg			

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: 2L Gluc 2.5%/NaCl 0,45% met per 500 mL: MMOL KCL (10 MMOL PER 500 ML)
		Start dag 1: Furosemide (lasix) 2ddmg push/i.v.
		Dag 1 t/m 5: Ondansetron (zofran) 2 dd 8 mg i.v.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Allopurinol 300mg: 1 ddmg

MEDISCHE INSTRUCTIES

- Eerste kuur via CVC, latere kuren via perifeer infuus.
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Bij de eerste kuur beenmergpunctie op dag 15 en bij repopulatie voor 2^{de} kuur, daarna na 2, 4 en 6^{de} kuur

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 2 dagen na de laatste gift Dactinomycine worden opgeheven; datum:Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans. Dagelijks 2 x daags wegen ten behoeve van vochtbalans. (bij >2kg Furosemide toedienen i.o.m. arts)
- Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.