

DARATUMUMAB Monotherapie (maintanance)

Therapielijst/ aftekenlijst/ aanvraag cytostatica

| | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|--|
| Patiëntsticker: | Datum aanvraag | Afdeling | | Gefaxt naar apotheek Ja/Nee | |
| | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Lich.opp (m ²) | | |
| | Code kuur E2: | 339966F | immunotherapie | | |
| | Naam + paraaf arts | | Naam + paraaf supervisor | | |
| Specialisme: IHMP Indicatie: Multipel Myeloom Relaps of refractair Cyclusduur: 4 weken Totaal: tot progressie onacceptabele toxiciteit Bron: SmPC: https://www.cbg-meb.nl/ | Afspraakcodes DC: DARA-snel: 2.30 uur | Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel) | | | |

Let op:

Opmerkingen:

Kuurnummer:

*TW=toedieningsweg

| DATUM | DAG | INLOOP-TIJD (hr:min) | GENEESMIDDEL | TW* | DOSIS | POMP STAND | TIV | TOELICHTING | Paraaf 1 | Paraaf 2 |
|-------|-----|----------------------|---|------|---------|------------|-----|-------------------|----------|----------|
| | 1 | | CLEMASTINE | iv | 2 mg | | | bolus | | |
| | 1 | | DEXAMETHASON | iv | 20 mg | | | bolus | | |
| | 1 | | PARACETAMOL | p.o. | 1000 mg | | | | | |
| | 1 | | | | | | | a. RR, pols, temp | | |
| | 1 | 00:30 | DARATUMUMAB 16 mg/kg in 500 ml NaCl 0,9% | iv | ... mg | 100 | 50 | 0,22 µm filter | | |
| | | 01:00 | | | | | | rest | | |
| | 1 | | | | | | | a. RR, pols, temp | | |

Verpleegkundige instructies:

- a. Controles 5 min voor start en na inloop Daratumumab.
- b. Inlooptijd afhankelijk van totaalvolume.
- Observeer tijdens Daratumumab op infusie-gerelateerde reacties.

Medische instructies:

- Voor start van therapie: "uittypering erythrocyten" met onder Medische indicatie benoemen "voor eerste behandeling met Daratumumab".
- Voor patiënten met een risico op respiratoire complicaties (patiënten met astma of COPD) kan de volgende post-infusie-medicatie overwogen worden:
 - Antihistaminicum (clemastine of equivalent)
 - Leukotriënantagonist (montelukast)
 - Kortwerkende Beta-2-mimeticum (b.v. salbutamol inhalatie)
 - Andere inhalatiemedicatie.

Achtergrondinformatie: **DARATUMUMAB Monotherapie (onderhoud)**

Informatie over de studie:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Multipel myeloom

Informatie over de geneesmiddelen:

- Daratumumab (JNJ-54767414): Humaan IgG1k monoklonale antistof gericht tegen CD38.
 - Bijwerkingen: Vermoeidheid, misselijkheid, anemie, rugpijn, neutropenie, hoesten, koorts, trombocytopenie, infecties bovenste luchtwegen, infusie gerelateerde reacties.
 - Door Daratumumab wordt de patiënt 'BIBO' en kan het uitgeven van compatibel bloed langer duren.

Infusie reacties Daratumumab

Infusie reactie bij graad 1 of 2

1. Stop daratumumab infusie en sluit een NaCl 0,9% infuus lijn aan op het kraantje.
2. Waarschuw de behandelend arts en overleg over toedienen medicatie (**let op**: behandeling naar inzicht arts).
3. Na overleg met de behandelend arts, wanneer de patiënt stabiel is, kan infusie worden herstart **op de helft van de snelheid voor onderbreking**.
4. Verdraagt de patiënt dit goed, kan het infuus weer worden opgehoogd volgens schema.

Infusie reactie bij graad 3 of hoger

1. Volg stap 1 t/m 4 zoals bij graad 1 of 2, PLUS:
2. Als na 2 uur nog steeds \geq graad 3; stop behandeling.
3. Mocht er na herstel opnieuw een reactie optreden, mag het stappenplan nogmaals doorlopen worden. Bij een derde reactie wordt de behandeling gestaakt.

N.B:

De meeste infusiegerelateerde reacties zijn waar te nemen in het hoofd-halsgebied.

Bijna alles is GR1 of 2 en betreft voornamelijk voorste luchtweg problemen en is goed te verhelpen met wat tavegil.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënten worden door arts ingelicht.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Zo nodig Allopurinol / rehydratie
- PCP profylaxe: 1x dd cotrimoxazol 480mg
- Profylaxe heractivatie herpes zoster: 2dd Valaciclovir 500mg
- Zo nodig bifosfonaten