

In studieverband :.....
 Buiten studieverband

DECITABINE
5 dagen

Therapielijst\aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: AML Cyclusduur: 28 dagen Totaal: minimaal 4,afhankelijk van respons dit continueren. Bron:	Afspraakcodes DC: DECITABINE: 2 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

Kuurnummer:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1 t/m 5						RR, pols, temp		
	1	01:00	DECITABINE 20 mg/m ² in 50 ml gekoeld NaCl 0,9%	iv	... mg		a.		
	2	01:00	DECITABINE 20 mg/m ² in 50 ml gekoeld NaCl 0,9%	iv	... mg				
	3	01:00	DECITABINE 20 mg/m ² in 50 ml gekoeld NaCl 0,9%	iv	... mg				
	4	01:00	DECITABINE 20 mg/m ² in 50 ml gekoeld NaCl 0,9%	iv	... mg				
	5	01:00	DECITABINE 20 mg/m ² in 50 ml gekoeld NaCl 0,9%	iv	... mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Screen op ondervoeding: neem op dag 1 de MUST af.

Achtergrondinformatie Decitabine

Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Behandeling van acute myeloïde leukemie (AML).
- Indicatie: Decitabine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten van 65 jaar en ouder met nieuw-geïdiagnosticeerde *de novo* of secundaire acute myeloïde leukemie (AML) met leucocyten/blasten aantal > 20 x 10⁹/l volgens de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in aanmerking komen voor standaard inductiechemotherapie.
- Evaluatie: Na 4 kuren vindt respons beoordeling plaats op basis van hematologische parameters en beenmerg evaluatie.

Informatie over het geneesmiddel:

- Decitabine: Cytostaticum. Decitabine is een cytidinedeoxy nucleoside-analoog dat in lage doses selectief DNA-methyltransferases remt, hetgeen resulteert in hypomethylering van de genpromotor, wat kan leiden tot reactivering van tumorsuppressorgenen, inductie van celdifferentiatie of celveroudering, gevolgd door geprogrammeerde celdood.
- Bijwerkingen:
 - koorts
 - trombocytopenie
 - anemie
 - neutropenie, febriele neutropenie
 - neusbloedingen
 - pneumonie
 - diarree, braken, misselijkheid
 - nausea
 - anafylactische reactie
 - hoofdpijn
 - septische shock, sepsis

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Folder decitabine