



Naam Behandelplan:	<b>IHEM ALLO ATG/FLU/TBI</b>	
Synoniemen:	Fludarabine	
Indicatie:	NMA- Mismatched MUD	
Cyclus duur:		
Totaal aantal cycli:	1	
Toedienlocatie:	Klinisch kuur, (dag -5) niet starten op maandag of dinsdag	
Behandelduur	nvt	
Facturerings indicatie:		
Zorgactiviteit:	339966E chemo-immuno	op dag 0: 333801S
12-NAT-code (indien studie)	nvt	
Bron		

Medicatie en oplossing	Doserin g	Toedie n wijze	Toedien tijd/ snelhei d	Dagen/ dag cycli													
				-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3				
Dag																	
Chemotherapie																	
ATG (Thymoglobuline Genzyme, konijnen)	2 mg/kg	i.v.	10.00- 20.00		x	x	x	x									
FLUDARABINE	30mg/m <sup>2</sup> in 50 ml NaCl 0,9 %	i.v.	08.30- 09.00				x	x	x								
Radiotherapie																	
TBI (in de ochtend) Verpleegkundige order Vandaag TBI toevoegen						x											
Thuis in te nemen medicatie/																	



Co-medicatie																		
Ursodeoxycholzuur (Ursochol)	2dd 6mg/kg (tabl a 300mg) start 2 weken voor tx	p.o.	07.00 17.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
(Norethisteron) Primolut N.	2 dd 5 mg	p.o.	07.00 17.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Multivitamine zonder ijzer	1 dd 1 caps	p.o.	07.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Anti- microbiële therapie																		
SDD																		
Valaciclovir (Zelitex)	2 dd 500mg	p.o.	07.00 17.00							x	x	x	x					
Co-trimoxazol (Bactrimel)	2 dd 960mg	p.o.	07.00 17.00 elke zat en zon	Dag -14 t/m dag -8. Dag +28 Co- trimoxa zol (Bactri mel) 2x960 mg/p.o. elke zaterda g en zondag														
Pre- medicatie/ anti-emetica																		
Clemastine (Tavegil)	2mg	i.v.	08.00		x	x	x	x										



Clemastine (Tavegil)	2mg	i.v.	1 uur voor tx							x								
Prednisolon	100mg in 100ml NaCl0,9 %	i.v.	08.15-08.30		x	x	x	x										
Ondansetron (Zofran)	2 dd 8mg	i.v.	07.00-17.00		x	x	x	x	x									
Metoclopramide	3dd 10 mg	i.v.	zn							x	x	x	x					
Hydratie																		
Trombo's (indien nodig)	ZN zie schema	i.v.	06.00-20.30		x	x	x	x	x									
NaCl0,9%	500ml/24u	i.v.	22.00-22.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Glucose 5%	500 ml/24 uur	i.v.	22.00-22.00							x	x	x	X en verder					
Dag 0: Bij ABO incompatibiliteit prehydratie: Zie separaat schema																		
Immunosuppressieve medicatie																		
Tacrolimus Dosering aanpassen aan nierfunctie. Conversie naar oraal 1:3 tot 4. (orale optie op de achtergrond)	0.03 mg/kg	i.v.	10.00-10.00				x	x	x	x	x	x	x	x				
Mycofenolaat (cellcept/mofetil) start dag 0 22.00 uur	3 dd 15 mg/kg	i.v.	07.00-14.00-22.00							x	x	x	x	x				





	ATG: zorgvuldige observatie van de patiënt. CAVE shock tgv reactie op lichaamsvreemd eiwit (koorts, oedeem, huiduitslag), ademnood, vernauwde luchtwegen en lage RR. Na de infusie dient de observatie nog ten minste 30 minuten te worden voortgezet. De bijwerkingen na toediening van ATG zijn misselijkheid, braken, duizeligheid, huiduitslag zwelling van extremiteiten (gezicht) botpijn, hoofdpijn, vermindering trombocyten, vermindering leukocyten, hypotensie, dyspnoe. Koorts van 40 °C of hoger en rillingen zijn zeldzaam een verdwijnen gewoonlijk weer binnen de eerste dagen van de behandeling.	
	Recovery Trombo's: 's morgens en 's avonds 1 uur na trombocytentransfusie en 4 uur na ATGAM gift	
	Trombo's bestraald door arts laten bestellen	
	Ochtend uitslag trombocyten < 20	voor ATG gift eerst trombocyten transfusie, 1uur na inlopen recovery bepalen
	Ochtend uitslag trombocyten 20 – 40	ATG toedienen, na toediening ATG, trombocytentransfusie. 4 uur na ATG toediening, trombocyten bepalen
	Ochtend uitslag trombocyten > 40	ATG toedienen, Na ATG toediening geen trombocytentransfusie. 4 uur na ATG toediening, trombocyten bepalen
	Trombocyten vòòr ATG geven om 6:00 uur zodat recovery meebepaald kan worden met dagelijkse lab ronde	
Specifieke materialen	Dag 0: Transplantatielijp zonder filter, gevuld met NaCl 0,9%. Geen bionecteur ertussen	
	Dag -1 TBI vandaag	

<b>Vitale gegevens</b>
Bij klinische opnames dagelijks om 8:00uur MEWS en gewicht

<b>Toegangsweg</b>	
CVC	Graag bouwblokje en bijbehorende orders inbouwen

<b>Spoedmedicatie</b> Ja op de dagen van ATG
--