

## INDIVIDUEEL PARTUSPLAN

### Beleid suppletie stollingsfactor rond partus bij patiënte met M. von Willebrand

Waarden voor de zwangerschap: FVIII:C ..%, vWF:RCF ..%, vWF:Ag ..%  
Waarden 3<sup>e</sup> trimester: FVIII:C ..%, vWF:RCF ..%, vWF:Ag ..%

### N.B. Haemate P ligt al op L3VA op naam van patiënt.

#### Algemeen:

- Stollingsarts in consult vragen voor begeleiding rondom de partus.
- voor de partus: von Willebrandfactor (VWF) en factor VIII suppleren naar >150 %
- Bij sectio caesarea gevolgd met continue infusie (zie verderop in plan).
- Product: Haemate P 1200 EH VWF/500 EH factor VIII met 10 ml oplosmiddel.
- Gewicht: ... kg
- Tranexaminezuur (Cyklokapron) 3 maal daags 1 gram i.v of per os, start direct na afklemmen navelstreng, 1e gift i.v., de vervolggiften mogen per os. Tranexaminezuur in elk geval continueren zolang de noodzakelijke frequentie van het verschonen van kraamverbanden nog hoog is (= vaker dan elke 3 uur).  
NB: borstvoeding mag wel gegeven worden tijdens het gebruik van Tranexaminezuur.
- Streefwaarden postpartum dalspiegel FVIII en vWF: 50-80% gedurende 3 dagen.

#### Praktisch beleid bij vaginale partus

- Kort (1-2 uur) voor verwachte start uitdrijving; Haemate P .. IE von Willebrandfactor / ... IE factor VIII i.v., in 10-15 minuten in laten lopen.
- indien de partus langer duurt dan 12 uur: na 12 uur herhalen Haemate P ... IE von Willebrandfactor / ... IE factor VIII
- indien de partus langer duurt dan 24 uur: opnieuw na 12 uur herhalen Haemate P ... IE von Willebrandfactor / ... IE factor VIII
- direct na afklemmen navelstreng start tranexaminezuur 3dd 1g, 1e gift i.v.,

#### Laboratorium controles

- Bij toediening van Haemate P dagelijks dalspiegels FVIII / VWF gedurende opname.

#### Beleid anesthesie

- Er is geen contra-indicatie voor het uitvoeren van spinale of epidurale anesthesie als de VWF / FVIII activiteit  $\geq 50\%$  bedragen rondom de procedure.

Bij vragen en/of problemen altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie (46836 of 19393) of de dienstdoende stollingsarts (77038 of via de centrale).

---

#### Praktisch beleid bij sectio caesarea

- Bij primaire sectio; vWF / FVIII suppleren naar 150%; Haemate P .. IE von Willebrandfactor / ... IE factor VIII i.v., in 10-15 minuten in laten lopen gevolgd met continue infusie 0,5/1,5 IE/kg/uur = .. IE / uur. Gebruik ampullen van .....EH met ..... ml oplosmiddel. Pompstand is ... ml/uur.

## FORMAT VOOR INDIVIDUEEL PARTUSPLAN von Willebrand

- Bij secundaire sectio (binnen 3 uur na bolus ): FVIII / vWF is voldoende voor sectio. Opstarten continue infusie met Haemate P 0,5 / 1,5 IE/kg/uur voor sectio of direct na. Gebruik ampullen van 1200 EH VWF met 10 ml oplosmiddel. Pompstand is ... ml/uur.
- Klaarmaken in spuit voor maximaal 24 uur: Haemate P ..... EH vWF / .... ml (= .... ampullen)
- Naast spuitenpomp (via dezelfde naald) alléén NaCl 0,9 % waakinfuus laten lopen.

#### **Algemeen:**

- Direct postpartum Oxytocine 5EH iv.
  - Tranexaminezuur 1000mg iv. na afklemmen navelstreng. Continueren 3 dd 1000 mg per os gedurende in ieder geval 10 dagen, daarna afhankelijk van hoeveelheid verschoningen
  - Postpartum dalspiegel VWF en FVIII : dag 1 na sectio > 80%, dag 2 t/m 5: >50%, dag 6 t/m 10: ≥30%.
- 

#### **Beleid bij fluxus (>500ml bloedverlies)**

- Obstetrisch beleid volgens fluxusprotocol. Extra stollingsonderzoek bij fluxus: FVIII en VWF activiteit. APTT, PT, trombocyten, fibrinogeen.
- Overweeg extra VWF/FVIII concentraat, bij type 2b trombocytenconcentraat i.o.m. dd stollingsarts (77038 of via de centrale).