

In studieverband
 Buiten studieverband

HAM
Mitoxantrone-HD-ARAC

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 1868	Gefaxt naar apothek Ja/Nee	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)		
	Code kuur E2↓				
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie		
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2	
Specialisme: IHM Indicatie: ALL/ AML Totaal: max 2 Cyccli Bron: Hidderman et al. High dose Cytosine Arabinoside and Mitoxantrone: a highly effective regimen in refractory AML. Blood 1987; 69 (3): 744-746					
Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)					

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 0		plaatsen CVK					
		Dag 1	09.00-12.00	CYTARABINE 3000 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
			21.00-24.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 2	09.00-12.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00-24.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 3	09.00-12.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			12.00-12.30	MITOXANTRONE 12 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00-24.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 4	09.00-12.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			12.00-12.30	MITOXANTRONE 12mg/m ²	i.v.mg			
			21.00-24.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 5	12.00-12.30	MITOXANTRONE 12 mg/m ²	i.v.mg			

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie start dag 0: 22.00 uur 2 l Gluc2.5%/NaCl0,45% met per liter:mmol KCL (20 ml)
		Start dag 1: 2 x dd..... mg Furosemide (lasix) (5 mg) push/i.v.
		Ondansetron (Zofran) voorafgaand aan kuur 1 x 8 mg i.v. Daarna 2 x 8 mg/p.o. t/m dag 6
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Benzylicilline-natrium (Penicilline) 4 x 1 milj. IE/i.v (Start dag 6 t/m t/m herstel bloedwaarden)
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Bij allergie op Benzylicilline-natrium (Penicilline), Co-trimoxazol 3 x 960 mg/dd/p.o. in plaats van penicilline en ciprofloxacine.

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 7 dagen na de laatste gift (mitoxantrone) worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositis score bijhouden.
- Mondverzorging volgens protocol
- Centraal veneuze katheter

ACHTERGRONDINFORMATIE

Cytarabine (Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C)

- Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metaboliëten.
- Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, huidrash, met pijn en blaarvorming vooral van handen en voeten, afhankelijk van de hoogte van de dosering en toedieningswijze leverfunctiestoornissen zelden koorts, stomatitis, haaruitval, anorexie, diarree
bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels noodzakelijk)

Mitoxantrone (Synoniem: Onkotrone Injection, DHAQ.)

- behorende tot de anthracyclinederivaten
- bijwerkingen: mucositis, leverfunctiestoornissen, neurotoxiciteit, huidrash, lethargie, verhoogde leverenzymen.
- Link
- De urine kan blauw/groen gekleurd zijn en er kan verkleuring van nagels en sclerae optreden.