

- In studieverband
 Buiten studieverband

HD-ARA-C voor ALLO-tx

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966E	chemo-immuno	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: AML met indicatie voor Allogene stamceltransplantatie Cyclusduur: tot regeneratie Totaal: 1	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 0		plaatsen CVK					
		Dag 1	10.00-13.00	CYTARABINE 2dd 3000 mg/m ² in 500 ml NaCl 0,9% inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
			22.00-01.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 2	10.00-13.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			22.00-01.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 3	10.00-13.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			22.00-01.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 4	10.00-13.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			22.00-01.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 5	10.00-13.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			22.00-01.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 6	10.00-13.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			
			22.00-01.00	CYTARABINE 3000 mg/m ²	i.v.mg			

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: Start dag 1: 1l Gluc2.5%/NaCl0,45%
		dag 1 t/m 5 Ondansetron (Zofran) 2dd 8 mg/i.v.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Penicilline 4 x 1 milj. IE/ i.v. Start dag + 8 t/m herstel bloedwaarden
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Bloedproducten bestralen.
		Start dag 1: Hypromellose 0,3% oogdruppels 6dd beiderzijds.

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Berekening
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels.
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 3 dagen na de laatste gift Cytarabine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositiscore bijhouden.
- Mondverzorging.

patiëntensticker

ACHTERGRONDINFORMATIE

Cytarabine

Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C, Depocyt

- Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metabolieten.
- Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, huidrash, met pijn en blaarvorming vooral van handen en voeten, afhankelijk van de hoogte van de dosering en toedieningswijze leverfunctiestoornissen zelden koorts, stomatitis, haaruitval ,anorexie, diarree
bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels noodzakelijk)