

In studieverband
 Buiten studieverband

HD-AraC/TT/DP (schema 2)
(Korfel schema Haematologica 2013)
CNS relapse bij agressief lymfoom

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓ <input type="checkbox"/>	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: CNS recidief van agressief lymfoom Cyclusduur: Start dag 22 van voorafgaande kuur(HDMTX/IFO/DEP of HD AraC/IT/DEP) Bron: Korfel A, et al: hematologica 2013; 98 p364-370	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 1	09:00-12:00	Cytarabine 3 g/m ² in 500 ml NaCl 0,9% inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
		Dag 2	09.00-12.00	Cytarabine 3 g/m ² in 500 ml NaCl 0,9% inlooptijd 3 uur	i.v.mg			
			14.00- 15.00	Thiotepa 40 mg/m ² in 250ml NaCl 0,9% inlooptijd 1 uur	i.v.mg			
		Dag 3	14.00	Cytarabine Lipsomaal (Depocyte)	lp/it	50mg			

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		1 L Gluc2,5%/NaCl0,45% per 24 uur, met per 1000ml 15mmol KCl
		Op dag 1 t/m dag 3 Ondansetron (Zofran) 2dd 8mg/p.o. of i.v.
		Dag 3 t/m 7: Dexamethason 2dd 4 mg/p.o. NB start voor gift Depocyte!!!!
		Indien dit schema als mobilisatiekuur wordt gegeven dan: dag 7 starten met 2dd GCSF 5µg/kg
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Bloedproducten bestralen

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK niet nodig!
- Frequentie controle hart-, lever-, en nierfunctie en bloedbeeld en diff.
- Dit schema maakt deel uit van het KORVEL protocol. Hierbij wordt gestart met HDMTX/IFO/DEP kuur, welke bij ontbreken van progressie 2x wordt gegeven. Daarna volgt deze kuur HDARA/TT/DEP. Bij PD op 1^e HDMTX/IFO/DEP wordt als 2^e kuur HDARA/TT/DEP gegeven. De volgende kuur na HDARA/TT/DEP is afhankelijk van voorafgaande kuren Indien dit de derde kuur is en nog geen stamcellerese heeft plaatsgevonden dan nu regelen!
- LP wordt gedaan door neuroloog, i.t. wordt gedaan door hematoloog.

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 3 dagen na de laatste gift Cytarabine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositis score bijhouden.
- Mondverzorging.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Cytarabine (ARA-C)

Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C, Depocyt

- Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metabolieten.
- Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, afhankelijk van de hoogte van de dosering en toedieningswijze leverfunctiestoornissen zelden koorts, stomatitis, haaruitval ,anorexie, diarree bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels)
- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. ARA-C.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels).

Thiotepa:

synoniem: Tepadina, Ledertepa (Adienne S.r.l)

- Alkylerend oncolyticum, interfereert met de DNA- en RNAsynthese.
- Gebruikt in combinatie met andere cytostatica als voorbereiding op HSCT
- Anticonceptie gedurende en tot één jaar na therapie. Cryopreservatie sperma.
- Geen contactlenzen dragen ivm conjunctivitis
- CAVE urineproductie, evt checken met bladderscan
- Bijwerkingen: [link](#)