

Naam Behandelplan:	IHEM AUTO SCT HDM	
Synoniemen:	Melfalan	
Indicatie:	Multiple Myeloom 18 -70 jaar	
Cyclus duur:	dit schema starten 4 tot max. 6 weken na stamcelaferese	
Totaal aantal cycli:	1 (niet starten op dinsdag of woensdag)	
Toedienlocatie:	Klinisch	
Behandelduur	Tot regeneratie	
Facturerings indicatie:	1603	
Zorgactiviteit:	339966B chemo gemetast	333806C autoSCT
12-NAT-code (indien studie)		
Bron	www.hovon.nl/HOVON 95	

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedienwijze	Toedien tijd/snelheid	Dagen/ dag cycli															
				-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dag				-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Chemotherapie																			
MELFALAN	1 x 100 mg/m ² in 100 ml NaCl0,9%	i.v.	10.00-10.15		x	x													
Thuis in te nemen medicatie/																			

Co-medicatie																			
KCl	20mmol	i.v.	09.00-09.00	x	x	x	x												
Norethisteron (Primolut N.) (bij vrouwen voor de menopauze)	2 dd mg	p.o.	07.00 17.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anti- microbiële therapie																			
Ciprofloxacin	2 x 500 mg	p.o.	07.00 17.00																
Fungizone	4 x 500 mg	p.o.	07.00 12.00 17.00 22.00																
Valaciclovir	2 x 500 mg	p.o.	Starten bij ontslag																
Penicilline	4 dd 1 milj. IE t/m herstel bloedwaarde n	i.v.	06.001.00 17.00 22.00						x										
Pre- medicatie/ anti-emetica																			

Solucortef (hydrocortison)	100 mg in 100 ml NaCl0,9%	i.v.	1 uur voor teruggave tx						x										
Clemastine (Tavegil)	2mg	i.v.	1 uur voor teruggave tx						x										
Ondansetron	2 dd 8mg	i.v.	07.00 17.00		x	x													
Aprepitant	125mg	p.o.	07.00		x														
Aprepitant	80mg	p.o.	07.00			x	x												
Metoclopramide	zn 3 dd 10mg	p.o.	07.00 12.00 17.00																
Dexamethason	12 mg	p.o.	07.00		x														
Dexamethason	8 mg	p.o.	07.00			x	x												
Hydratie																			
NaCl 0,9%	500 ml	i.v.	22.00-22.00	x	x	x	x	x											

Patiënt informatie:

- Haaruitval
- langdurige misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg voor voldoende vocht inname
- Pijn
- Koorts

- Bloedingen
- Excreta

Afspraakaanvragen										
Cyclus/dag	-4									
Opname order nodig	x									

Lab										
Cyclus/dag										
Hematologie										
Chemie										
SDD-kweken										

Allen volgens klinisch protocol

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Bestraalde bloedproducten	Bestraalde bloedproducten tot 1 jaar na TX

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Kuurspecifieke maatregelen	Mondhygiëniste inschakelen bij opname voor poetsinstructie en mondverzorging
	Bij Melfalan toediening en bij spoelen de patiënt ijs in de mond geven.
	Melfalan is onverenigbaar met glucose-oplossingen
	Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 2 dagen na de laatste gift Melfalan worden opgeheven
	dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging
	Tijd transplantatie staat vermeld in agenda, i.p. is standaardtijd autologe transplantatie 10.30 u
	spoedkar in de buurt

Specifieke materialen	TX: Transplantatielijn zonder filter, gevuld met NaCl 0,9%. Geen bionecteur ertussen
-----------------------	--

Vitale gegevens	
Bij klinische opnames dagelijks om 8:00uur MEWS en gewicht	

Toegangsweg	
CVC	Graag bouwblokje en bijbehorende orders inbouwen

Spoedmedicatie Ja op dag 0
