

In studieverband   
 Buiten studieverband

**ALL >40 jaar: HOVON 100 ("schema D")  
 CONSOLIDATIE II**

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 1395	Gefaxt naar apothek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: ALL > 40 jr Cyclusduur: 22-29 dagen Totaal: 4 kuren + /- maintenance Bron: www.hovon.nl /HOVON 100		Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

**Opmerkingen:**

\*TW=toedieningsweg

\*\* MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaats en	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 1	09:00-10:00	<b>CYTARABINE</b> 1000 mg/m <sup>2</sup> In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 1 uur	i.v.	.....mg			
			21:00-22:00	<b>CYTARABINE</b> 1000 mg/m <sup>2</sup>	i.v.	.....mg			
		Dag 2	09:00-10:00	<b>CYTARABINE</b> 1000 mg/m <sup>2</sup>	i.v.	.....mg			
			21:00-22:00	<b>CYTARABINE</b> 1000 mg/m <sup>2</sup>	i.v.	.....mg			
		Dag 3	10:00-11:00	<b>PEG-L-ASPARAGINASE ONCASPAR</b> Totaal 1000IU/m <sup>2</sup> In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 60 min. <b>Niet eerder starten dan 6 uur na ARA-C</b> <b>Let op aanvragen via studie recept Hovon 100!</b>	i.v.	.....IU			
		Dag 15		<b>METHOTREXATE</b>  <b>PREDNISOLON</b> In 1 spuit leveren	i.t.	15 mg  25 mg			
		Dag 18	10:00-11:00	<b>PEG-L-ASPARAGINASE ONCASPAR</b> Totaal 1000IU/m <sup>2</sup>	i.v.	.....IU			

patiëntensticker

### Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: 2 L Gluc 2,5%/NaCl 0,45% met per liter.....ml KCL (20ml)
		Tijdens hydratie furosemide 2xdgs .....mg i.v. push
		Ondansetron (Zofran)1 x dd 8 mg i.v. voorafgaand aan ARA-C, daarna 2x8 mg p.o. t/m dag 3
		S.D.D.: volgens protocol <a href="http://www.hematologiegroningen.nl">www.hematologiegroningen.nl</a>
		PCP profylaxe cotrimoxazol za en zo 2 x 960 mg/po en valaciclovir 2 x 500 mg
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Hypromellose oogdruppels 0,3% 6xdgs. Dag1 t/m regeneratie
		Bloedproducten bestraald bij patiënten in arm B

### MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- **Bij PEG-L-asparaginase geen Imatinib of dasatinib geven tot 2 weken na de laatste gift**
- Amylase controle ivm kans op pancreatitis
- Extra labafname via research verpleegkundige op dag 1,3,10,18, en 25
- Evaluatie beenmerg tussen dag 22 en dag 29
- **Bij CNS-localisatie (bij diagnose) 24 Gy tussen dag 29 en dag 43, mits geen myeloablative SCT is gepland**
- Indien geschikte donor dan na Consolidatie II allogene SCT inplannen (dan dus geen Maintenance)
- Start Maintenance tussen dag 22 en 29

### VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Bij toediening PEG-Asparaginase een spoedsetje klaarzetten: ampul clemastine 2mg, ampul Prednisolon 25 mg, Adrenaline Sterile solution mini-jet (1mg/10ml)
- Bij PEG-Asparaginase pols en tensie controle tijdens en half uur na gift
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositis score bijhouden.
- Mondverzorging.
- SIB opmaat uitreiken <http://www.sibopmaat.nl/>
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 6 dagen na de laatste gift Cytarabine worden opgeheven; datum: .....

## ACHTERGRONDINFORMATIE

### **Cytarabine** (Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C, Depocyt)

- Cytostaticum behorende tot de anti-metaboliëten.
- [Link](#)
- [Link](#) protocol cytostatica toediening subcutaan

### **PEG-L-Asparaginase** (Synoniem: Oncospar, PEG-L-Asparaginase)

- Enzym met oncolytische werking. Het katalyseert de splitsing van L-asparagine, een voor bepaalde tumorcellen essentieel aminozuur, in L-asparaginezuur en ammoniak. Hierdoor wordt de groei van deze tumorcellen geremd.
- [Link](#)
- Bijwerkingen pancreatitis, leverfunctie stoornissen, allergische reactie.  
Bron: origineel protocol HOVON 100
- Bij toediening PEG-L-Asparaginase een spoedsetje klaarzetten: intraveneus: ampul clemastine 2mg, ampul Prednisolon 25 mg, Adrenaline Sterile solution mini-jet (1mg/10ml).