

In studieverband
 Buiten studieverband

**HOVON 132, arm A cyclus I,
 Standaard schema Idarubicine + Cytarabine**

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 1868	Gefaxt naar apothek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: dosis-selectie fase Lenalidomie vs standaard schema; 18- 65 jaar met nieuwe AML/ high risk MDS Cyclusduur: ≥ 21 dagen Totaal: 3 cycli Bron: www.hovon.nl/hovon_132		Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 1	09:00-12:00	IDARUBICINE 12mg/m ² in 250ml NaCl 0,9% inlooptijd: 3 uur	i.v.mg			
			13.00-11.00	CYTARABINE 200mg/m ² in 500ml NaCl 0,9% inlooptijd 22 uur	i.v.mg			
		Dag 2	09:00-12:00	IDARUBICINE 12mg/m ²	i.v.mg			
			13.00-11.00	CYTARABINE 200mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 3	09:00-12:00	IDARUBICINE 12mg/m ²	i.v.mg			
			13.00-11.00	CYTARABINE 200mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 4	13.00-11.00	CYTARABINE 200mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 5	13.00-11.00	CYTARABINE 200mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 6	13.00-11.00	CYTARABINE 200mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 7	13.00-11.00	CYTARABINE 200mg/m ²	i.v.mg			

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Start dag 1: Hydratie: 2l Gluc2.5%/NaCl0,45% met per 500 ml:mmol KCl (10 mmol per 500 ml)
		Dag 1: Furosemide (lasix) 2 x ddmg push/i.v.
		Van dag 1 t/m 8 Ondansetron (Zofran)2 x dd 8 mg/i.v.
		Dag 1 t/m regeneratie Hypromellose 0,3% oogdruppels 6 x dd
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v. Start dag 8 t/m herstel bloedwaarden
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- ECG en longfunctie onderzoek is noodzakelijk
- Vóór start cyclus II cristabioptie

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Furosemide is onverenigbaar met Idarubicine!
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 3 dagen na de laatste gift Cytarabine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mondverzorging
- Mucositisscore
- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels).

ACHTERGRONDINFORMATIE

Idarubicine

Synoniem: 4-Demethoxydaunomycine (D-DNM)

- Cytostaticum: behoort tot antracyclinegroep
- Urine kan oranje gekleurd zijn. Dragen van contactlenzen eerste 48 uur na toediening niet toegestaan.
- Bijwerkingen: beenmergdepressie, infectie, koorts, misselijkheid, braken, diarree, mucositis, stomatitis

Cytarabine

Synoniem: cytosine arabinside, ARA-C, Depocyt

- Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metaboliëten.
- Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, huidrash, met pijn en blaarvorming vooral van handen en voeten, afhankelijk van de hoogte van de dosering en toedieningswijze leverfunctiestoornissen zelden koorts, stomatitis, haaruitval, anorexie, diarree, bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels noodzakelijk)

1 Scheme of study

