

In studieverband :.....

Buiten studieverband

IDM
(intermediate dose melfalan)

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling		Gefaxt naar apotheek Ja/Nee	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)		
	Code kuur E2:	339966B	chemo gemetast		
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: MM, AL-amyloidose Totaal: 1 Bron:	Afspraakcodes DC: IDM (3 uur 45 min)	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1						RR, pols, temp, AH		
	1						infuus met roze naald prikken		
	1		ONDANSETRON	iv	8 mg		bolus		
	1		FUROSEMIDE	p.o.	40 mg				
	1	01:00	500 ml NaCl 0,9% + 10 ml KCL	iv					
	1	00:30	MELFALAN 70 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9%	iv	... mg		ijs in de mond geven		
	1	01:30	1000 ml NaCl 0,9% + 30 ml KCL	iv					
	1						RR, pols, temp, AH		

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	4		G-CSF 300 – 480 µg	sc			recept arts		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Bij dyspnoe: arts waarschuwen.
- Melfalan is onverenigbaar met glucose oplossingen.
- Screen op ondervoeding: neem de MUST af.

Medische instructies

- G-CSF < 80 kg: 300 µg 1 x dd sc
> 80 kg: 480 µg 1 x dd sc

Start dag 4 t/m dag 14, max. 10 dagen. Doorgaan tot granulo's >1.0x10⁹/l zijn, 2 x gemeten.

Achtergrondinformatie IDM (intermediate dose melfalan)

Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Amyloïdose, multipel myeloom
- Indicatie: AL-amyloïdose > 65-75 jaar, multipel myeloom
- Evaluatie: afspraak op de polikliniek voor bloedbeeld controle maximaal 5 dagen na de chemotherapie.
- Vervolg: autologe stamcelteruggave.

Informatie over het geneesmiddel:

- Melfalan: aromatisch stikstofmosterd derivaat met bifunctionele alkylerende werking. Cytostaticum uit de klasse der alkylerende verbindingen.
 - Melfalan is na bereiding maar 2 uur houdbaar.
 - Ijs in de mond tijdens de toediening van Melfalan vermindert mogelijk ernstige mucositis.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- SDD: Fluconazol 1 x 150 mg/p.o, Ciprofloxacin 2 x 500 mg/p.o
- G-CSF < 80 kg: 300 µg 1 x dd sc
> 80 kg: 480 µg 1 x dd sc
Start dag 4 t/m dag 14, max. 10 dagen. Doorgaan tot granuloc's >1.0x10⁹/l zijn, 2 x gemeten.
Alternatief: Neulasta 6 mg/sc dag 2 voor de nacht.
- Bij vrouwen voor de menopauze: Primolut N. 2 x 5 mg/p.o
- Ondansetron: Voorafgaand aan kuur 1 x 8 mg/i.v, daarna 2 x 8 mg/p.o.