

In studieverband
 Buiten studieverband

**Groningerschema,
 O.P.A. I en II
 ALL inductiekuur**

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: ALL <70 Cyclusduur: ≥ 14 dagen (OPA 2 starten na regeneratie van OPA I) Totaal: Pre-inductie/OPA I/OPA II/ Consolidatie/Maintenance 2 jaar of Allo tx Bron: Hovon 71 (www.hovon.nl)		Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	ja	Dag 1 t/m 21	08.00	Prednisolon 1 mg/kg lichaamsgewicht (afrounden naar veelvoud van 10)	p.o.mg		**	**
		Dag 1	10.00–10.15	VINCISTINE Totaal 1 x 1 mg In 50 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 15 min.	i.v.	1 mg			
		Dag 2	10.30-11.00	DOXORUBICINE ≤ 60 jr 40 mg/m ² > 61 jr 30 mg/m ² In 50 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 30 min.	i.v.mg			
		Dag 3	10.30-11.00	DOXORUBICINE ≤ 60 jr 40 mg/m ² > 61 jr 30 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 4	10.30-11.00	DOXORUBICINE ≤ 60 jr 40 mg/m ² > 61 jr 30 mg/m ²	i.v.mg			
		Dag 8	10.00–10.15	Vincristine 1 mg	i.v.	1 mg			
		Dag 15	10.00–10.15	Vincristine 1 mg	i.v.	1 mg			

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: 1 - 2 ltr Gluc 2,5%/NaCl 0,45% met per liter:mmol KCl (20 ml)
		Furosemide (Lasix) 1-2 x dd 5 mg. i.v. afhankelijk van spoelschema
		Ondansetron (Zofran): voorafgaand aan Doxorubicine 1 x 8 mg i.v. Daarna 2 x dd 8 mg p.o. t/m dag 5
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Penicilline 4 x 1 milj. IE i.v. Start dag + 5 t/m herstel bloedwaarden
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		CNS profylaxe volgens schema

CZS profylaxe via LP of Ommaya (Let op eerste 4 weken 1 keer per week, zie Groningerschema Pre-inductie)

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Maand 2		Methotrexaat Dosis afhankelijk van leeftijd**	i.t.mg		
		Maand 3		Methotrexaat Dosis afhankelijk van leeftijd**	i.t.mg		
		Maand 4		Methotrexaat Dosis afhankelijk van leeftijd**	i.t.mg		
		Maand 5		Methotrexaat Dosis afhankelijk van leeftijd**	i.t.mg		
		Maand 6		Methotrexaat Dosis afhankelijk van leeftijd**	i.t.mg		

**Dosis aanpassing volgens leeftijd

Middel	Dosis
METHOTREXAAT (MTX)	≤60 jr. 15 mg
i.t. toediening	61-65 jr. 10 mg
	66-70 jr. 7,5 mg

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- NB: Tumorlysis bij hoge tumor-load: zie protocol m.n bij hoog kreatinine: opname ICB, overleg Nefrologie.
- Letten op voldoende proteïne intake tijdens prednison.
- Letten op neuropathie, dan vincristine dosis reduceren.
- Bloedsuikercontroles ivm prednison gebruik
- Prednison kan gewoon gestopt worden; behalve wanneer het langer dan 6 weken gebruikt is; dan met 10 mg/dd verminderen
- OPA 2 start na regeneratie (Leukocyten $> 3 \times 10^9/l$) ten vroegste op dag 22

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Maatregelen kuur (ph meten urine, voorbereidingen, etc).
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen **2 dagen** na de laatste gift **Vincristine** worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositiscore bijhouden.
- Mondverzorging.
- Bloedsuikercontroles ivm Prednisolon 2 x per week; nuchter en 14.00 uur. Bij verhoogde bloedsuikers dagelijks meten en interventies afspreken met de arts.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Vincristine (Synoniem: leurocristine)

- Cytostaticum behorende tot de vinca-alkaloiden
- [Link](#)
- Attentie bij extravasatie: blaarvormend; zie crashkaart
- Cave neuropathie klachten.

Doxorubicine (Synoniem: adriablastine, adriamycine)

- Cytostaticum behorende tot de antracycline.
- [link](#)
- Doxorubicine is een blaarvormende stof, consulteer een plastische chirurg bij extravasatie
- Urine kan oranje gekleurd zijn.
- Dragen van contactlenzen eerste 48 uur na toediening niet toegestaan.