

In studieverband :.....   
 Buiten studieverband

## VINBLASTINE bij Langerhanscel histiocytose: LOW RISK

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )	
	Code kuur E2:	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: Langerhanscel histiocytose Single System Ziekte Cyclusduur: Inductie: wekelijks Maintenance: à 3 weken Totaal: Inductie: 6 kuren Maintenance: 6 maanden	Afspraakcodes DC: VINBLASTIN 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

### Opmerkingen:

### Inductiekuur

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1		ONDANSETRON	iv	8 mg	bolus		
	dage-lijks		PREDNISOLON 1 mg/kg/dag (max. 60 mg)	p.o		a. recept arts		
	1	00:15	VINBLASTINE 6 mg/m <sup>2</sup> (max. 10 mg) in 50 ml NaCl 0.9%	iv	... mg	b. in max. 15 min.		

### Verpleegkundige toedien-instructies

- b. Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.
- Screen op ondervoeding: neem de MUST af.

### Medische instructies

- a. 4 weken achtereen, gevolgd door 2 weken afbouwschema.

## Inductiekuur

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	8		ONDANSETRON	iv	8 mg	bolus		
	dage-lijks		PREDNISOLON 1 mg/kg/dag (max. 60 mg)	p.o		a. recept arts		
	8	00:15	VINBLASTINE 6 mg/m <sup>2</sup> (max. 10 mg) in 50 ml NaCl 0.9%	iv	... mg	b. in max. 15 min.		

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	15		ONDANSETRON	iv	8 mg	bolus		
	dage-lijks		PREDNISOLON 1 mg/kg/dag (max. 60 mg)	p.o		a. recept arts		
	15	00:15	VINBLASTINE 6 mg/m <sup>2</sup> (max. 10 mg) in 50 ml NaCl 0.9%	iv	... mg	b. in max. 15 min.		

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	22		ONDANSETRON	iv	8 mg	bolus		
	dage-lijks		PREDNISOLON 1 mg/kg/dag (max. 60 mg)	p.o		a. recept arts		
	22	00:15	VINBLASTINE 6 mg/m <sup>2</sup> (max. 10 mg) in 50 ml NaCl 0.9%	iv	... mg	b. in max. 15 min.		

### Verpleegkundige toedien-instructies

- b. Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.

### Medische instructies

- a. 4 weken achtereen, gevolgd door 2 weken afbouwschema.

### Inductiekuur

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	29		ONDANSETRON	iv	8 mg	bolus		
	dage-lijks		PREDNISOLON 1 mg/kg/dag (max. 60 mg)	p.o		a. recept arts		
	29	00:15	VINBLASTINE 6 mg/m <sup>2</sup> (max. 10 mg) in 50 ml NaCl 0.9%	iv	... mg	b. in max. 15 min.		

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	36		ONDANSETRON	iv	8 mg	bolus		
	dage-lijks		PREDNISOLON 1 mg/kg/dag (max. 60 mg)	p.o		a. recept arts		
	36	00:15	VINBLASTINE 6 mg/m <sup>2</sup> (max. 10 mg) in 50 ml NaCl 0.9%	iv	... mg	b. in max. 15 min.		

### Verpleegkundige toedien-instructies

- b. Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.
- Screen op ondervoeding: neem op dag 29 de MUST af.

### Medische instructies

- a. 4 weken achtereen, gevolgd door 2 weken afbouwschema.

Maintenance zie volgende pagina

**Maintenance, Dag 1 = 43**

Kuurnummer: .....

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1		ONDANSETRON	iv	8 mg	bolus		
	1	00:15	<b>VINBLASTINE</b> 6 mg/m <sup>2</sup> (max. 10 mg) in 50 ml NaCl 0.9%	iv	... mg	<i>b.c.</i> in max. 15 min.		
	dagelijks tot einde behandeling		6-MERCAPTOPYRINE 30 mg/m <sup>2</sup> (max. 50 mg)	p.o		recept arts		
	dag 1 t/m 5; elke 3 weken tot einde behandeling		PREDNISOLON 1 mg/kg/dag (max. 60 mg)	p.o		recept arts		

**Verpleegkundige toedien-instructies**

- *b.* Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.
- Screen op ondervoeding: neem de MUST af.

**Medische instructies**

- *c.* Mag pas starten 3 weken ná laatste vinblastine-injectie van de inductietherapie.
- Bij gelijktijdig gebruik van allopurinol en 6-Mercaptopurine moet de dosering 6-Mercaptopurine verlaagd worden (tot 25% van de aanbevolen dosis).

## Achtergrondinformatie over Vinblastine bij Langerhanscel histiocytose: low risk

### Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Langerhanscel histiocytose
- Indicatie: Indicatie: Langerhanshistiocytose, infiltraten van clonaal prolifererende Langerhanscellen met lymfocyten, eosinofielen en normale histiocyten, welke op elke leeftijd kunnen voorkomen, het meest op de kinderleeftijd.
- Single system ziekte: bij multifocale bothaarden, wervellesies met wekedelen betrokkenheid die wervelkanaalcompressie kunnen geven, CNS-risico: betrokkenheid van aangezichtsbotten, voorste en middelste fossa met doorgroei intracranieel.
- Multisystem ziekte – LOW RISK: geen betrokkenheid risico-organen, zoals lever, milt, beenmerg, long.
- Evaluatie: 6 weken
- Vervolg: Bij respons na 6 weken, continueren met maintenance therapie.

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Vinblastine: Antimitotisch cytostaticum behorende tot de vinca-alkaloïden.
- Mercaptopurine: cytotoxisch, purine-analoog
- Prednisolon: Corticosteroïd met glucocorticoïde eigenschappen.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Prednisolon:
  - Informeer de patiënt de Prednisolon 's morgens in te nemen.