

IHEM T-NHL Mogalizumab



Naam Behandelplan:	IHEM T-NHL Mogalizumab CUP	
Synoniemen:	Mogamulizumab	
Indicatie:	Sézary Syndrome (SS) en CTCL, MF	
Cyclus duur:	28 dagen	
Totaal aantal cycli:	Maximaal 12	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur	(inloop tijd 1 uur)	
Facturerings indicatie:	Nog niet geregistreerd CUP	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron	Kim, Y.H et al, Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial Lancet Oncol 2018; 19: 1192–204	

Cyclus 1

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli				
				Dag	1	8	15	22
Chemotherapie								
Mogamulizumab	1 mg/kg	IV	60 min	x	x	x	x	
Pre- medicatie/ anti-emetica								
Paracetamol	1000 mg	PO						
Clemastine	2 mg	IV						

Vanaf cyclus 2

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli	
				Dag	1
Chemotherapie					
Mogamulizumab	1 mg/kg	IV	60 min	x	x
Pre- medicatie/ anti-emetica					
Paracetamol	1000 mg	PO			
Clemastine	2 mg	IV			

Patiënteninformatie:

- Huiduitslag



IHEM T-NHL Mogalizumab

- Misselijkheid
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg voor voldoende vocht inname
- Pijn
- Koorts, koude rillingen
- Verkoudheid

Afspraakaanvragen							
Cyclus/dag	C1D0	C1D1	C1D8	C1D15	C1D22	*C2D1	*C2D15
Arts	X					X	
Verpleegkundig specialist	X			X			X
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X

*en elke volgende cyclus tot maximaal 12

Lab										
Cyclus/dag	C1D0	C1D15	C2D1*							
Hematologie (Leuco, neutro's absoluut, MCV, Hb, Ht trombocyten)	X	X	X							
Chemie (Kreat, LDH, ASAT, tot bili, glucose)	X	X	X							
Schildklierfunctie (THS, FT4)	x		X							
Virusserologie (Hep en C, HIV)	x									
Oncolifes	x									

* Vanaf cyclus 2 elke 8 weken



Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid starten volgende cyclus	Dosisreductie is niet toegestaan

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoeligheidsreacties
Toedieninstructie 1	Controles voor en na toediening mogamulizumab
Algemeen 20	Indien complicaties optreden tijdens inlopen.

Vitale gegevens						
	RR	Pols	SpO2	AF	temp	gewicht
Voor start mogalizumab	x	x			x	
Na inlopen mogalizumab	x	x			x	

Toegangsweg	
Perifeer	

Spoedmedicatie Ja

Algemene achtergrondinformatie	
mogamulizumab	Eigenschappen: een gedefucosileerd, gehumaniseerd, IgG1 monoklonaal antilichaam met een verbeterde antilichaam afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit (ADCC; Potelligent®) welke zich bindt met CCR4
	Als een reactie optreedt tijdens het inlopen van mogaluzumab, in overleg met de behandelaar: <ul style="list-style-type: none"> - bij graad 1/2: het infuus 15-30 minuten stopzetten, 1000 mg paracetamol per os en 2 mg Clemastine (of benadryl 50 mg iv). Bij verdwijnen van de symptomen het infuus op halve snelheid hervatten, als de symptomen na 30 minuten nog niet verdwenen zijn de infusie niet hervatten en eventueel 20 mg dexamethason i.v. - Bij graad 3/4: het infuus 15-30 minuten stopzetten 1000 mg paracetamol per os, 2 mg Clemastine (of benadryl 50 mg iv), 50 mg pethidine iv, dexamethason 20 mg iv, Albuterol of salbutamol inhaler 2 puffs, O2 via neuscanule. Bij verdwijnen van de symptomen het infuus op halve snelheid hervatten, als de symptomen na 30 minuten nog niet verdwenen zijn de infusie niet hervatten