



Moederprotocol IHEM FL OBINOTUZUMAB BENDAMUSTINE

Naam Behandelplan:	IHEM FL OBINOTUZUMAB BENDAMUSTINE	
Synoniemen:	Obinotuzumab, Bendamustine	
Indicatie:	Folliculair lymfoom	
Cyclus duur:	28 dagen	
Totaal aantal cycli:	6- 8	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Facturerings indicatie:		
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron	JCO 2018, 36:2323-2325	

Cyclus 1:

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag													
				1	2					8	15						
Chemotherapie																	
OBINOTUZUMAB In 250ml 0,9% NaCl.	1000mg	IV	Volgens opbouwschema	X													
Bendamustine In 0,9% NaCl	530ml	IV	In 45 min	X					X	X							
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
Paracetamol	1000mg	PO	1xdd	X					X	X							
Clemastine 1mg/ml	2mg	IV	Bolus	X					X	X							
Prednisolonnatriumsuccinaat	100mg	IV		X					X	X							
Ondansetron 2mg/ml	8mg	IV		X													

Opbouwschema Obinotuzumab:

- STAP 1: 30 minuten 15 ml/uur TIV 7
- STAP 2: 30 minuten 30 ml/uur TIV 15
- STAP 3: 30 minuten 45 ml/uur TIV 22
- STAP 4: 30 minuten 60 ml/uur TIV 30
- STAP 5: 30 minuten 75 ml/uur TIV 37
- STAP 6: 30 minuten 90 ml/uur TIV 45
- STAP 7: 30 minuten 100 ml/uur TIV 50
- STAP 8: De rest van het infuus laten inlopen op 120 ml/uur.

Cyclus 2, 3, 4, 5, 6:

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag													
				1	2												
Chemotherapie																	
Obinotuzumab In 250ml 0,9% NaCl.	1000mg	IV	Volgens opbouwschema	X													
Bendamustine In 0,9% NaCl	530ml	IV	In 45 min	X	X												
Pre- medicatie/ anti-emetica																	



Moederprotocol IHEM FL OBINOTUZUMAB BENDAMUSTINE

Paracetamol	1000mg	PO	1xdd	X													
Clemastine 1mg/ml	2mg	IV	Bolus	X													
Prednisolonnatriumsuccinaat	100mg	IV		X													
Ondansetron 2mg/ml	8mg	IV		X													

Opbouwschema Obinotuzumab:

STAP 1: 30 minuten 30 ml/uur TIV 15

STAP 2: 30 minuten 60 ml/uur TIV 30

STAP 3: 30 minuten 90 ml/uur TIV 45

STAP 4: De rest van het infuus laten inlopen op 120 ml/uur.

Patiënt informatie:

- Haarveranderingen
- Jeuk
- Verwachte misselijkheid en braken
- Diarree/ obstipatie
- Intake (gewichtsverlies)
- Pijn: mond, hoofdpijn
- Infecties en infuusreacties
- Koorts
- Vermoeidheid en slapeloosheid
- Beenmerg: tekort aan bloedarmoede, leukopenie, tekort aan bloedplaatjes
- Excreta: 2 dagen

Afspraakaanvragen																
Cyclus/dag	C0 D1	C1 D1	C1 D2	C1 D8	C1 D1 5	C2 D1	C2 D2	C3 D1	C3 D2	C4 D1	C4 D2	C5 D1	C5 D2	C6 D1	C6 D2	C6 D5 2
Arts	X					X		X		X				X		X
Verpleegkundig specialist	X															
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X	

Lab							
Cyclus/dag	C2D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C6D42
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	
LDH	X	X	X	X	X	X	
APTT							
PT							
INR							
ALAT	X	X	X	X	X	X	
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	
Neutro	X	X	X	X	X	X	



Moederprotocol IHEM FL OBINOTUZUMAB BENDAMUSTINE

(absoluut)							
Glucose	X	X	X	X	X	X	
OncoLifes ESTA (opslg bloedbuis tbv (DNA)	X						
OncoLifes ESTA plasma + buffycoat opslag standaard	X						
OncoLifes seum (stolbuis) opslag standaard	X						
OncoLifes Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag	X		X				X

Lab aanvragen onder de tabel specificeren (bouwsteen of studielab) en weghalen indien niet van toepassing

Beeldvormend onderzoek	
Cyclus/ dag	
PET/CT	X



Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Algemeen 14	Kies voor: <ul style="list-style-type: none"> - Jong/fit: 90mg/m² Bendamustine - Frail/oud: 70mg/m² Bendamustine

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver. Tot nader order Start na vrijgave Tot nader order
Algemeen 1	<ul style="list-style-type: none"> - Tijdens de giften kan tumorlysis syndroom ontstaan. - Adviseer de patiënt minimaal 2 liter te drinken in 24 uur. - Informeer de patiënt de arts te waarschuwen zodra hij/zij late infusiereacties opmerkt. Tot nader order Start na vrijgave gedurende 5 dagen
Algemeen 9	Check of Ondansetron is ingenomen. Tot nader order Start na vrijgave Tot nader order
Toedieningsinstructies 6	30 minuten wachten na premedicatie
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoeligheidsreacties. Tot nader order Start na vrijgave Tot nader order

Verpleegkundige orders				
Eenmalig, start na vrijgave .	RR	HR	AF	Temp

Toegangsweg	
Perifeer	

Spedmedicatie Ja
