

IHEM FL OBINUTUZUMAB MAINTENANCE



Naam Behandelplan:	IHEM FL OBINOTUZUMAB MAINTENANCE	
Synoniemen:	Obinutuzumab	
Indicatie:	Folliculair lymfoom	
Cyclus duur:	56 dagen	
Totaal aantal cycli:	11	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur	C1D1: 360 min Vanaf C2: 300 min	
Factureringsindicatie:	2851	
Zorgactiviteit:	339966F	chemo-immuno
Bron	JCO 2018, 36:2323-2325	

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	1												
Chemotherapie																	
OBINUTUZUMAB In 250ml 0,9% NaCl.	1000 mg	IV	Zie opbouwschema	X													
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
Paracetamol	1000 mg	PO	1xdd	X													
Clemastine	2 mg	IV	Bolus	X													
Prednisolon (1 ^e cyclus)	100 mg	IV	Bolus	X													
Prednisolon (vanaf 2 ^e cyclus)	25 mg	IV	Bolus	X													

Opbouwschema Obinutuzumab cyclus 1:

STAP 1: 30 minuten 15 ml/uur TIV 7
 STAP 2: 30 minuten 30 ml/uur TIV 15
 STAP 3: 30 minuten 45 ml/uur TIV 22
 STAP 4: 30 minuten 60 ml/uur TIV 30
 STAP 5: 30 minuten 75 ml/uur TIV 37
 STAP 6: 30 minuten 90 ml/uur TIV 45
 STAP 7: 30 minuten 100 ml/uur TIV 50
 STAP 8: De rest van het infuus laten inlopen op 120 ml/uur.

Opbouwschema Obinutuzumab vanaf cyclus 2:

STAP 1: 30 minuten 30 ml/uur TIV 15
 STAP 2: 30 minuten 60 ml/uur TIV 30
 STAP 3: 30 minuten 90 ml/uur TIV 45
 STAP 4: De rest van het infuus laten inlopen op 120 ml/uur

IHEM FL OBINUTUZUMAB MAINTENANCE



Patiënt informatie:

- Kuur specifiek
 - Drink veel (2 liter in 24 uur) water en let op eventuele late infuusreacties.
- Beenmerg; bloedarmoede, leukopenie, tekort aan bloedplaatjes
- Darmen; diarree
- Haar; haarveranderingen
- Huid; jeuk
- Hoofdpijn
- Infecties
- Infuusreacties
- Koorts
- Krachtsvermindering
- Slapeloosheid

Afspraakaanvragen												
Cyclus/dag	C0D1	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	C9D1	C10D1	C11D1
Arts	X	X		X		X		X		X		X
Verpleegkundig specialist	X		X		X		X		X		X	
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lab											
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	C9D1	C10D1	C11D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver
Algemeen 1	Tijdens giften kan tumorlysis syndroom ontstaan, adviseer de patiënt minimaal 2 liter te drinken in 24 uur. Informeer de arts te waarschuwen zodra hij/zij late infusiereacties opmerkt.
Toedieningsinstructies 6	30 minuten wachten na premedicatie
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties.

Vitale gegevens meten				
Eenmalig, start na vrijgave .	RR	HR	AF	Temp
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X	X

Toegangsweg	
Perifeer	

Spoedmedicatie Ja
