



## IHEM HL Pembrolizumab bij recidief of refractair Hodgkin lymfoom

Naam Behandelplan:	IHEM HL Pembrolizumab bij recidief of refractair Hodgkin lymfoom	
Synoniemen:	Pembrolizumab	
Indicatie:	Recidief of therapieresistent Hodgkin Lymfoom	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	Tot progressie of onacceptabele toxiciteit	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur	90 minuten	
Facturerings indicatie:	2879	
Zorgactiviteit:	339966F	immunotherapie

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli											
				Dag	1										
<b>Chemotherapie</b>															
<b>Pembrolizumab</b> in 100 ml NaCl 0.9%	<100 kg: 2 mg/kg > 100 kg: 200 mg	IV	00:30	X											

### Patiënt informatie:

- Bloedarmoede
- Diarree/ verstopping/ buikpijn
- Grieperig gevoel/ spierpijn
- Vocht vasthouden
- huiduitslag/ jeuk
- Benauwdheid
- Misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust
- Pijn in spieren of gewrichten
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn
- Koorts

Afspraakaanvragen		
Cyclus/dag	COD1	C1D1 -C9D1
Arts/VS	X	Alternerend Arts/VS bij start nieuwe cyclus.
Verpleegkundig specialist	X	
Dagcentrum afspraak		X





## IHEM HL Pembrolizumab bij recidief of refractair Hodgkin lymfoom

Lab		
Cyclus/dag	C1D1	C2D1 – C9D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X
LDH	X	X
ALAT	X	X
Kreatinine	X	X
Totaal Bilirubine	X	X
Neutro (absoluut)	X	X
Glucose	X	X
TSH	X	X
FT4	X	X
Cortisol	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X	
OncoLifes EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X	
OncoLifes serum (stolbuis) opslag -standaard	X	
OncoLifes Streckbuis (plasma cf-DNA) Opslag	X	
TARC Hodgkin lymfoom	X	X

Beeldvorming/ overig	
PET-scan	Geen standaardafspraken, ter beoordeling hoofdbehandelaar
CT-scan	

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In geval van extravasatie volg docportal en overleg met voorschrijver
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Algemeen 20	Complicaties bij Brentuximab
Toedieningsinstructies 6	30 minuten wachten na premedicatie
Toedieninstructies 7	Observeer voor 15 minuten op infusie gerelateerde bijwerkingen.

Vitale gegevens meten				
Enmalig, start na vrijgave	RR	HR	AF	Temp
	X	X		X

Toegangsweg	
Perifeer	

<b>Spoedmedicatie Ja</b>
--------------------------

