

Patiënt is bekend met factor VII deficiëntie, eigen factor VII %

Algemeen:

- Stollingsarts in consult vragen voor perioperatieve begeleiding gedurende de opname.
- Twee uur voor de ingreep: factor VII suppleren naar >20-30% gevolgd met continu infusie.
- Product: Factor VII concentraat 600 EH in 10 ml. solvens, (voor de 1e dagX..... EH bestellen).
- Gewicht: .. kg
- Tranexaminezuur (Cyklokapron) 3 maal daags 1 gram per os, start avond voor OK, continueren gedurende dagen.
- Infuus niet in elleboog/pols/handvenen waarin patiënt zelf thuis spuit (indien van toepassing).

PRAKTISCH gezien op ...-.. (datum):

- Preoperatief: bolus van EH factor VII om ...:.. uur, in 10-15 minuten in laten lopen.
- Gevolgd door continu infuus 2 EH/kg/uur= EH. Oplossing is 10 ml/ 600 EH. Dus pompstand is ml/uur.

Klaarmaken in spuit voor maximaal 12 uur: .. ml/..... EH Factor VII concentraat. Spuit niet aanvullen met NaCl en niet verwisselen voordat deze leeg is!

Naast spuitenpomp (via zelfde naald) alléén NaCl 0,9 % waakinfuus laten lopen.

- Factor VII bepalen om ...:.. uur (15 minuten nadat de bolus is ingelopen). (Stollingslaboratorium belt de waarde door aan de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of dienstdoende stollingsarts en indien factor VII spiegel adequaat is, zal patiënt vrijgegeven worden voor operatie).
- Direct postoperatief opnieuw Factor VII spiegel bepalen.
- Post-operatief dagelijks Factor VII spiegel bepalen.

BELANGRIJK:

- Tijdens opname mag alléén in overleg met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of stollingsarts gegeven;
 - LMWH (nadroparine) in profylactische dosering zodra duidelijk is dat er geen bloeding is na de operatie en te continueren zolang stollingsfactor boven de 50% is.
 - epidurale of spinale anaesthesie, NSAID's, coumarines, intramusculaire injecties.
- Bloedafname voor factor VII meting in vacuümbuis met blauwe dop, niet uit arm met factor VII infuus (vacuümbuis moet volledig gevuld).
- Continueren pomp gedurende dgn.
 - Dag van ingreep en dag 1 streven naar factor VII spiegel rond: 20-30%
 - Dag 2- (5) postoperatief rond: 10-20%
- Ondersteuning van verpleegkundig specialist/consulent hemofilie rondom hele zorgproces is mogelijk tijdens kantooruren; neem contact op met: 46836 of 19393; (M. Voskuilen en/of F. Yspeerd).

Bij vragen en/of problemen altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie (46836 of 19393) of de dienstdoende stollingsarts (77038 of via de centrale).

Peri-operatief beleid tav factor VII deficiëntie, volw.