

Patiënt is bekend met Hemofilie A en gaat op(datum) voor eeningreep.
Eigen factor VIII %

Algemeen:

- Stollingsarts in consult vragen voor perioperatieve begeleiding gedurende de opname.
- Twee uur voor de ingreep: factor VIII suppleren naar >80-100 % gevolgd met continu infusie.
- Product: Advate 500 EH in 2 ml. (voor de 1e dagX..... EH bestellen).
- Gewicht: .. kg
- Tranexaminezuur (Cyklokapron) 3 maal daags 1 gram per os, start avond voor OK, continueren gedurende dagen.
- Infuus niet in elleboog/pols/handvenen waarin patiënt zelf thuis spuit.

PRAKTISCH gezien op ..-. (datum):

- Preoperatief: via spuitpomp bolus van EH om uur, in 10-15 minuten in laten lopen.
- Gevolgd door continu infuus 3 EH/kg/uur = EH/uur. Oplossing is 2 ml/ 500 EH. Dus pompstand is ml/uur.
- Klaarmaken in spuit voor maximaal 24 uur: .. ml/..... EH Advate. Spuit niet aanvullen met NaCl en niet verwisselen voordat deze leeg is!
- **Naast spuitpomp (via zelfde naald) alléén NaCl 0,9 % waakinfuus laten lopen.**
- Factor VIII (chromogeen) bepalen om uur (15 minuten nadat de bolus is ingelopen).
- (Stollingslaboratorium belt de waarde door aan de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of dienstdoende stollingsarts en indien factor VIII spiegel adequaat is, zal patiënt vrijgegeven worden voor operatie).
- Direct postoperatief opnieuw Factor VIII (chromogeen) spiegel bepalen.
- Post-operatief dagelijks Factor VIII (chromogeen) spiegel bepalen.

BELANGRIJK:

- Tijdens opname mag alléén in overleg met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of stollingsarts gegeven;
 - LMWH (nadroparine) in profylactische dosering start dag +1 zodra duidelijk is dat er geen bloeding is na de operatie en te continueren zolang stollingsfactor boven de 50% is.
 - epidurale of spinale anaesthesie, NSAID's, coumarines, intramusculaire injecties.
- Bloedafname voor factor VIII meting in vacuümbuis met blauwe dop, niet uit arm met factor VIII infuus (vacuümbuis moet volledig gevuld).
- Continueren pomp gedurende dgn.
 - Dag van ingreep en dag 1 streven naar factor VIII spiegel rond: 80-100%
 - Dag 2-5 postoperatief rond: 50-80%
 - Dag 6-7(10) postoperatief rond: 30-50%
 - Daarna over op profylaxe schema (indien van toepassing).
- Ondersteuning van verpleegkundig specialist/consulent hemofilie rondom hele zorgproces is mogelijk tijdens kantooruren; neem contact op met: 46836 of 19393; (M. Voskuilen en/of F. Yspeerd).

Peri-operatief beleid tav Hemofilie A, volw.

Bij vragen en/of problemen altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie (46836 of 19393) of de dienstdoende stollingsarts (77038 of via de centrale).