

Patient is bekend met Hemofilie B en gaat op (datum) voor.....
eigen factor IX %

Algemeen:

- Stollingsarts in consult vragen voor perioperatieve begeleiding gedurende de opname.
- Twee uur voor de ingreep: factor IX suppleren naar >80-100 % gevolgd met continu infusie.
- Product: Rixubis; 500 EH in 5 ml. (voor de 1e dagX..... EH bestellen).
- Gewicht: .. kg
- Tranexaminezuur (Cyklokapron) 3 maal daags 1 gram per os, start avond voor OK, continueren gedurende dagen.
- Infuus niet in elleboog/pols/handvenen waarin patiënt zelf thuis spuit.

PRAKTISCH gezien op ... (datum):

- Preoperatief: bolus van EH om ... uur, in 10-15 minuten in laten lopen.
- Gevolgd door continu infuus 3 EH/kg/uur= EH. Oplossing is 5 ml/ 500 EH. Dus pompstand is ml/uur.
- Klaarmaken in spuit voor maximaal 24 uur: .. ml/..... EH Rixubis. Spuit niet aanvullen met NaCl en niet verwisselen voordat deze leeg is!
- Naast spuitenpomp (via zelfde naald) alléén NaCl 0,9 % waakinfluus laten lopen.
- Factor IX bepalen om ... uur (15 minuten nadat de bolus is ingelopen).
- (Stollingslaboratorium belt de waarde door aan de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of dienstdoende stollingsarts en indien factor IX spiegel adequaat is, zal patiënt vrijgegeven worden voor operatie).
- Direct postoperatief opnieuw Factor IX spiegel bepalen.
- Post-operatief dagelijks Factor IX spiegel bepalen.

BELANGRIJK:

- Tijdens opname mag alléén in overleg met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of stollingsarts gegeven;
 - LMWH (nadroparine) in profylactische dosering start dag +1 zodra duidelijk is dat er geen bloeding is na de operatie en te continueren zolang stollingsfactor boven de 50% is.
 - epidurale of spinale anaesthesie, NSAID's, coumarines, intramusculaire injecties.
- Bloedafname voor factor IX meting in vacuümbuis met blauwe dop, niet uit arm met factor IX infuus (vacuümbuis moet volledig gevuld).
- Continueren pomp gedurende dgn.
 - Dag van ingreep en dag 1 streven naar factor IX spiegel rond: 80-100%
 - Dag 2-5 postoperatief rond: 50-80%
 - Dag 6-7(10) postoperatief rond: 30-50%
 - Daarna over op profylaxe schema (indien van toepassing).
- Ondersteuning van verpleegkundig specialist/consulent hemofilie rondom hele zorgproces is mogelijk tijdens kantooruren; neem contact op met: 46836 of 19393; (M. Voskuilen en/of F. Yspeerd).

Peri-operatief beleid tav Hemofilie B, volw.

Bij vragen en/of problemen altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie (46836 of 19393) of de dienstdoende stollingsarts (77038 of via de centrale).