

Patient is bekend met M. von Willebrand type en gaat op ..... voor.....

Eigen: factor VIII ..... %, vWF:Ag .....%, vWF:RCF .....%

Algemeen:

- Stollingsarts in consult vragen voor perioperatieve begeleiding gedurende de opname.
- Twee uur voor de ingreep: von Willebrandfactor (VWF) suppleren naar >80-100 % gevolgd met continu infusie.
- Product: Veyvondi 650 EH in 5 ml oplosmiddel. (voor de 1e dag .....X 650 EH (VWF) bestellen).
- Gewicht: .. kg
- Tranexaminezuur (Cyklokapron) 3 maal daags 1 gram per os, start avond voor OK, continueren gedurende 10 dagen.
- Infuus niet in elleboog/pols/handvenen waarin patiënt zelf thuis spuit (indien van toepassing).

PRAKTISCH gezien op ..-.. (datum):

- Preoperatief: bolus van ..... EH om ...:.. uur, in 10-15 minuten in laten lopen.
- Gevolgd door continu infuus 1,5 EH/kg/uur= ..... EH. Oplossing is 5 ml/ 650 EH. Dus pompstand is .... ml/uur.
- Klaarmaken in spuit voor maximaal 24 uur: ... ml/..... EH Veyvondi. Spuit niet aanvullen met NaCl en niet verwisselen voordat deze leeg is!
- Naast spuitenpomp (via zelfde naald) alléén NaCl 0,9 % waakinfluus laten lopen.
- vWF:Ag of vWF:RCF bepalen om ...:.. uur (15 minuten nadat de bolus is ingelopen).
- (Stollingslaboratorium belt de waarde door aan de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of dienstdoende stollingsarts en indien vWF spiegel adequaat is, zal patiënt vrijgegeven worden voor operatie).
- Direct postoperatief opnieuw vWF:Ag of vWF:RCF spiegel bepalen.
- Post-operatief dagelijks vWF:Ag of vWF:RCF spiegel bepalen.

BELANGRIJK:

- Tijdens opname mag alléén in overleg met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie of stollingsarts gegeven;
  - LMWH (nadroparine) in profylactische dosering start dag +1 zodra duidelijk is dat er geen bloeding is na de operatie en te continueren zolang stollingsfactor boven de 50% is.
  - epidurale of spinale anaesthesie, NSAID's, coumarines, intramusculaire injecties.
- Bloedafname voor VWfactor meting in vacuümbuis met blauwe dop, niet uit arm met von willebrand infuus (vacuümbuis moet volledig gevuld).
- Continueren pomp gedurende .... dgn.
  - Dag van ingreep en dag 1 streven naar vWF spiegel rond: 80-100%
  - Dag 2-5 postoperatief rond: 50-80%
  - Dag 6-7(10) postoperatief rond: 30-50%
- Ondersteuning van verpleegkundig specialist/consulent hemofilie rondom hele zorgproces is mogelijk tijdens kantooruren; neem contact op met: 46836 of 19393; (M. Voskuilen en/of F. Yspeerd).

Peri-operatief beleid tav M. von Willebrand, volw.

Bij vragen en/of problemen altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist/consulent hemofilie (46836 of 19393) of de dienstdoende stollingsarts (77038 of via de centrale).