

## Moederprotocol IHEM NHL R-CEOP-21



Naam Behandelplan:	IHEM NHL R-CEOP 21	
Synoniemen:	Vincristine, Cyclofosfamide, Rituximab, Etoposide	
Indicatie:	Non-Hodgkin	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	6-8	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	1 <sup>e</sup> kuur (langzame): 480 min 2 <sup>e</sup> kuur (snelle): 300 min	
Facturerings indicatie:	1430, 160, 469	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli										
				Dag	1	2	3	4	5					21
Chemotherapie														
<b>ETOPOSIDE</b> In 500 ml NaCl 0,9 %	50 mg/m <sup>2</sup>	IV	01:00	X										
	100 mg/m <sup>2</sup>	PO			X	X								
<b>VINCRIStINE</b> In 50 ml NaCl 0,9%	1,4 mg/m <sup>2</sup> max. 2 mg	IV	00:15	X										
<b>CYCLOFOSFAMIDE</b> In 100 ml NaCl 0,9%	750 mg/m <sup>2</sup>	IV	00:30	X										
<b>RITUXIMAB</b> 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	04:00 (langzaam)	X										
			01:00 (snelle)											
<b>PREDNISOLON</b>	100mg	PO	Ochtend	X	X	X	X	X						
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Ondansetron (1 <sup>e</sup> gift IV)	2xdd 8mg	PO	Max 5 dagen	X	X	X	X	X						
Movicolon (bij obstipatie)	1 sachet zo nodig 3xdd	PO												
Allopurinol (bij hoge tumorload tijdens eerste kuur)	300mg	PO	1xdd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pre- medicatie/ anti-emetica														
ONDANSETRON	8 mg	IV	Bolus	X										
PREDNISOLON	25 mg	IV	Bolus	X										
CLEMAStINE	2 mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000 mg	PO		X										



**Patiënt informatie:**

- Kuur specifieke bijwerkingen:
  - Prednisolon kan stijging glucosespiegel geven (bij 1<sup>e</sup> kuur controle bij de huisarts 2 uur na de lunch).
  - Eet geen pompoemes of grapefruit vanwege interactie.
- Haaruitval
- Huidverkleuring en jeuk
- Verwachte misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg vol voldoende vochtinname
- Pijn (hoofdpijn)
- Koorts
- Bloedingen
- Beenmerg; bloedarmoede, tekort aan witte bloedcellen en bloedplaatjes. Leukopenie en trombocytopenie.
- Polyneuropathy (zenuwpijn): Vincristine
- Krachtsvermindering
- Excreta: 6 dagen

Afspraakaanvragen										
Cyclus/dag	C1D0	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	C8D5 5
Arts	X		X		X	X	X		X	X
Verpleegkundig specialist	X			X		X		X		
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X	X	X	

Lab								
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X							
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X							
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X							



OncoLifeS Streckbuis (plasma cf- DNA) opslag	X			X			
---	---	--	--	---	--	--	--

Beeldvorming/ overig			
Cyclus/ dag	C3D16		C8D42
PET-scan	X		X
CT-scan	X		

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Beleid bij neurotoxiciteit	Dosering Vincristine aanpassen bij neurotoxiciteit.
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij eerdere overgevoelighedsreacties en/of lymfoomcellen <math>&gt; 5 \times 10^9/l</math> : steeds langzame schema voorschrijven.</li> <li>Indien voor het begin van de volgende kuur leukocyten <math>&lt; 4 \times 10^9/l</math> en/ of trombocyten <math>&lt; 100 \times 10^9/l</math> zijn, dan 1 week uitstellen. Indien na 1 week uitstel onvoldoende herstel: dosis aanpassen volgens onderstaand schema.</li> </ul>

Leuko $\times 10^9/l$	Trombox $10^9/l$	C	E	O	P	R
$> 3$	$> 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.0 – 3.0	$> 100$	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %
1.0 – 2.0	50 - 100	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %
$< 1$	$< 50$	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %

## Moederprotocol IHEM NHL R-CEOP-21



Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab

Vitale gegevens			
	RR	HR	TEMP
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja