

Moederprotocol IHEM NHLB R-CHOP14



Naam Behandelplan:	IHEM NHLB R-CHOP14	
Synoniemen:	Doxorubicine, Vincristine, Cyclofosfamide, Rituximab	
Indicatie:	Lymfatische (B-cel) - maligniteiten	
Cyclus duur:	14 dagen	
Totaal aantal cycli:	6	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	1 ^e kuur (langzame): 420 min 2 ^e kuur (snelle): 240 min	
Facturerings indicatie:	1430, 160, 469	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron		



Moederprotocol IHEM NHLB R-CHOP14

	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli										
				Dag	1	2	3	4	5					
Chemotherapie														
DOXORUBICINE (in folie) In 50 – 100 ml NaCl 0,9%	50 mg/m ²	IV	00:15	X										
VINCRIStINE In 50 ml NaCl 0,9%	1,4 mg/m ² max. 2 mg	IV	00:15	X										
CYCLOFOSFAMIDE In 100 ml NaCl 0,9%	750 mg/m ²	IV	00:30	X										
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema Let op ook op C6D14 + C6D28	375 mg/m ²	IV	04:00 (langzaam) 01:00 (snelle)	X										
PREDNISOLON	100mg	PO	Ochtend	X	X	X	X	X						
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Ondansetron (1 ^e gift IV)	2xdd 8mg	PO	Max 3 dagen	X	X									
Movicolon (bij obstipatie)	1 sachet zo nodig 3xdd	PO												
Allopurinol (bij hoge tumorload)	1 dd 300mg	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pegfilgrastim 10mg/ml	6mg	SC	Eenmalig		X									
Cotromoxazol	1xdd 480 mg	PO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valaciclovir	2xdd 500mg	PO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pre- medicatie/ anti-emetica														
ONDANSETRON 2mg/ml	8mg	IV	Bolus	X										
PREDNISOLON 12,5mg/ml	25mg	IV	Bolus	X										
CLEMAStINE 1mg/ml	2mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000mg	PO		X										



Patiënt informatie:

- Kuur specifieke bijwerkingen:
 - Roodgekleurde urine (Doxorubicine)
 - 1^e 48 uur geen contactlenzen dragen
 - Prednisolon kan stijging in glucosespiegel geven (bij 1^e kuur controle bij de huisarts 2 uur na de lunch).
 - Eet geen pompoelmoes of grapefruit vanwege interactie.
- Haarausval
- Verwachte misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg vol voldoende vochtinname
- Pijn
- Koorts
- Bloedingen
- Polyneuropathy (zenuwpijn): Vincristine
- Excreta: 6 dagen

Afspraakaanvragen										
Cyclus/dag	C0D1	C1D1	C2D2	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C6D14	C6D28	C6D52
Arts	X		x		X		X			X
Verpleegkundig specialist	X			x		x				
Dagcentrum afspraak		X	x	x	x	x	x	X	X	

Lab									
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C6D14	C6D28	
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X								
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X								
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X								
OncoLifeS	X			X					

Moederprotocol IHEM NHLB R-CHOP14



Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Beeldvorming/ overig			
Cyclus/ dag	C3D12		C6D42
PET	X		X
CT	X		

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Beleid bij neurotoxiciteit	Dosering Vincristine aanpassen bij neurotoxiciteit.
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	<ul style="list-style-type: none"> Bij eerdere overgevoelighedsreacties en/of lymfoomcellen $> 5 \times 10^9/l$: steeds langzame schema voorschrijven. Indien voor het begin van de volgende kuur leukocyten $< 4 \times 10^9/l$ en/ of trombocyten $< 100 \times 10^9/l$ zijn, dan 1 week uitstellen. Indien na 1 week uitstel onvoldoende herstel: dosis aanpassen volgens onderstaand schema.

Leuko $\times 10^9/l$	Trombox $10^9/l$	C	H	O	P	R
> 3	> 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.0 – 3.0	> 100	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %
1.0 – 2.0	50 - 100	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %
< 1	< 50	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab

Vitale gegevens			
	RR	Pols	Temp
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja