



Naam Behandelplan:	IHEM NHLB R-DHAP
Synoniemen:	Cisplastine, Cytarabine, Rituximab
Indicatie:	CD20 positief NHL salvage.
Cyclus duur:	14-21 dagen
Totaal aantal cycli:	3
Toedienlocatie:	Kliniek
Facturerings indicatie:	2400, 2402
Zorgactiviteit:	339966E
Bron	Hovon 44

Cyclus 1, 2 en 3:

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	1	2	3	4	5	6						21	
Chemotherapie																	
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema	375 mg/m ²	IV	10:00 Langzaam: 240 min Snel: 60 min	X													
CISPLASTINE In NaCl 0,9%	100 mg/m ²	IV	9:00 (24 uur)		X												
CYTARABINE In NaCl 0,9%	2 dd 2000mg/m ²	IV	9:00 (180 min) 21:00 (180 min)			X											
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																	
Pegfilgrastim	6 mg	SC									X						
Filgrastim (alleen bij mobilisatie starten op dag 6)	1 x 5µg/kg/dag	SC									X	X	X	X			
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
Paracetamol	1.000 mg	PO	30 min voor start Rituximab	X													
Clemastine	2 mg	IV	30 min voor start Rituximab	X													
Prednisolon	25 mg	IV	30 min voor start Rituximab	X													
Dexamethason	40 mg	IV	00:15		X	X	X	X									
Aprepitant	125 mg	Capsule			X												
Aprepitant	80 mg	Capsule				X											
Ondansetron	2 dd 8mg	IV			X	X	X	X	X	X							
Metoclopramide	3 dd 10mg (zo	IV															



	nodig)																	
Hydratie																		
NaCl 0,9%	500 ml/dag	IV	Continu	Starten om 22:00														
NaCl 0,9% per 1000 ml toegevoegd: 20 mmol kaliumchloride*	5000 ml/ 24 uur	IV	05:00 per 1000 ml	X	X	X												
Magnesiumsulfaat	750 mg	IV	Bolus Toevoegen aan infuuszak 23:59	X														
Furosemide	3xdd 20 mg	IV	Bolus		X	X												

* Hyperhydratie minimaal continueren tot en met dag 3 van de kuur. Stoppen afhankelijk van de nierfunctie na cisplatine. Start 6 uur voor cisplatine infuus.

Patiënt informatie:

- Beenmerg
 - bloedarmoede
 - tekort aan bloedplaatjes
 - tekort aan witte bloedcellen
- Darmen
 - diarree
- Misselijkheid en braken
- Nierfunctiestoornis
- Gehoorafwijkingen
- Huiduitslag en jeuk
- Koorts
- Infecties
- Hoofdpijn
- Infuusreacties
- Zenuwstelsel: beschadiging aan het zenuwstelsel
- Haarveranderingen
- Krachtsvermindering
- Excreta: Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 7 dagen na de laatste gift Cisplatine worden opgeheven

Afspraakaanvragen						
Cyclus/dag	C1D1	C1D10	C2D1	C2D10	C3D1	C3D10
Verpleegkundig specialist		X		X		X
Opname order	X		X		X	

Lab				
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C2D15	C3D1
Leuko, Hb, Trombo	X	X		X
CRP	X	X		X
Natrium	X	X		X
Kalium	X	X		X
Ureum	X	X		X
Kreatinine	X	X		X



Calcium	X	X		X
Albumine	X	X		X
Fosfaat	X	X		X
Magnesium	X	X		X
ASAT	X	X		X
ALAT	X	X		X
LDH	X	X		X
Alkalische fosfatase	X	X		X
Gamma-GT	X	X		X
Totaal Bilirubine	X	X		X
Type & Screen	X	X		X
Neutro (absoluut)	X	X		X
Glucose	X	X		X
OncoLifes ESTA plasma + buffycoat opslag standaard	X			
OncoLifes ESTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X			
OncoLifes serum (stolbuis) opslag - standaard	X			
OncoLifes Streckbuis (plasma cf-DNA) Opslag	X		X	
Lab ochtendronde*	X	X		X

*Starten op dag 2. Tot nader order. Natrium, glucose, kalium, magnesium, calcium, albumine, fosfaat, kreatinine.

Beeldvormend onderzoek		
Cyclus/dag	C1D3	C2D15
ECG	X	
CT		X
PET		X

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Algemeen 2	Schrijf klinisch pegfilgrastim voor onder orders toevoegen indien patiënt openomen blijft.
Algemeen 3	GEEN pegfilgrastim geven indien stamcelmobilisatie. Neem contact op met verpleegkundige consulent transplantatie voor het aanmaken van het aferese protocol.



Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Allergische reacties `1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Extravasatie 1	In geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver
Algemeen 15	Huidverzorging: vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine. Voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
Algemeen 20	Indien complicaties optreden tijdens inlopen: <ul style="list-style-type: none"> - Zet lijn rituximab stop - Sluit infuussysteem met NaCl 0,9% aan en zet de lijn open - Laat een collega de specialist en arts assistent waarschuwen - Doe controles: RR, Pols, Temperatuur. Gedurende de rest van de controles a 15 min. Tot 1 uur na het inlopen van het infuus. - Bed in Trendelenburg - In overleg met specialist: indien na enige tijd de klachten verdwijnen of verminderen mag de toediening worden hervat met de helft van de voorgaande infusiesnelheid. - Bij eerdere overgevoelighedsreacties: steeds toedienen volgens het langzame schema.
Infuus inbrengen	Perifeer infuus inbrengen
Gewicht meten	2 keer per dag (8:00/20:00)
Afnemen MEWS	Elke dag om 8:00
Mondverzorging	Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging
Neus kweek staphylococcus aureus	Eenmalig afdelingsafname
Keel SDD-kweek	Eenmalig afdelingsafname
Rectum SDD-kweek	Elke maandag
Keel SDD kweek	Elke maandag

Vitale gegevens			
	Temp	RR	HF
3 dd om 6:00/12:00/20:00	X		

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja