



Naam Behandelplan:	IHEM NHL R-PECC	
Synoniemen:	Vincristine, Cyclofosfamide, Rituximab, Etoposide	
Indicatie:	Non-Hodgkin	
Cyclus duur:	28 dagen	
Totaal aantal cycli:	6	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	1 ^e kuur (langzame): 360 min 2 ^e kuur (snelle): 150 min	
Facturerings indicatie:	1430, 160, 469	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedi en wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	1	2	3	4	5							28	
Chemotherapie																	
LOMUSTINE (Belustine)	80 mg/m ²	PO		X													
ETOPOSIDE	100 mg/m ²	PO		X	X	X	X	X									
CHLOORAMBUCIL (Leukeran)	8 mg/m ²	PO		X	X	X	X	X									
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema	375 mg/m ²	IV	04:00 (langzaam) 01:00 (snelle)	X													
PREDNISOLON	40 mg/ m2	PO	Ochtend	X	X	X	X	X									
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																	
Metoclopramide	Zo nodig 3 dd 10 mg	PO	Max 5 dagen														
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
PREDNISOLON	25 mg	IV	Bolus	X													
CLEMASTINE	2 mg	IV	Bolus	X													
PARACETAMOL	1000 mg	PO		X													



Patiënt informatie:

Kuur specifieke bijwerkingen:

Lomustine

- beenmergsuppressie (na 3-6 weken), cumulatief
- misselijkheid en braken
- stomatitis
- nefrotoxiciteit
- pulmonaire fibrose, voornamelijk bij hoge (>1100 mg/m²) cumulatieve dosering

Etoposide

- beenmergsuppressie
- haaruitval
- misselijkheid en braken
- hypotensie en pulmonale klachten bij te snelle toediening
- stomatitis
- allergische reacties (huidreacties)

Chloorambucil

- beenmergsuppressie
- zelden gastro-intestinale toxiciteit
- huidafwijkingen, zelden haaruitval
- zelden pulmonaire fibrose (kan echter fataal zijn)

Excreta: 6 dagen

Afspraken								
Cyclus/dag	C1D0	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C6D52
Arts	X		X		X	X	X	X
Verpleegkundig specialist	X			X		X		
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X	



Lab								
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	X	X
CRP	X	X	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X
Type & Screen	X	X	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X							
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X							
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X							
OncoLifeS Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag	X			X				

Beeldvorming/ overig		
Cyclus/ dag	C3D21	C6D42
PET-scan	X	X
CT-scan	X	

Zorgverlener communicatieorders	
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	<ul style="list-style-type: none"> Bij eerdere overgevoeligheidsreacties en/of lymfoomcellen $> 5 \times 10^9/l$: steeds langzame schema voorschrijven. Indien voor het begin van de volgende kuur leukocyten $< 4 \times 10^9/l$ en/ of trombocyten $< 100 \times 10^9/l$ zijn, dan 1 week uitstellen. Indien na 1 week uitstel onvoldoende herstel: dosis aanpassen volgens onderstaand schema.

Moederprotocol IHEM NHL R-PECC



Verpleegkundige orders	
Toedieninstructie 6	30 minuten wachten na toediening premedicatie 1 ^e cyclus
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoeligheidsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab

Vitale gegevens			
	RR	HR	TEMP
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja