

Recovery factor VIII / IX bij kinderen met Hemofilie

LOKATIE:

Functiecentrum en Polikliniek Kindergeneeskunde van de Beatrix Kinderkliniek
UMCG

DOEL:

inzicht verkrijgen in het verloop van het gehalte van factor VIII of IX na substitutie bij hemofiliepatiënten

UITVOERING:

1 verpleegkundige

INDICATIE:

- bij starten van een behandeling met stollingsfactoren
- bij het overgaan op een ander preparaat
- bij onvoldoende effect van de behandeling

CONTRA-INDICATIES:

-geen; uitzonderingen mogelijk, worden bepaald door de arts

MOGELIJKE COMPLICATIES:

-nabloeding van infuusplaats

BENODIGDHEDEN:

- procedure
- dossier patiënt
- stollingspreparaat is te bestellen via apotheekbon op naam, of voorraad koelkast poli (oost)
- infuusmateriaal / VAP materialen
- citraatbuisjes, blauwe dop
- 2 en 5 ml spuit
- chloorhexidine 0,5%
- gaasjes
- bekkentje
- onsteriele handschoenen (voor eigen hygiëne)
- naamstickers
- stollingsformulieren, poliplus

PATIENTGEGEVENS:

Sticker patiënt

Product
Aantal eenheden voor de test

.....Eenheden

Gewicht patiënt:.....kg

Handtekening aanvragend en voorschrijvend arts.....
WERKWIJZE:

- Patiënt komt op afgesproken datum en tijd op Functiecentrum
- breng een infuus in / prik VAP aan.
- los voor de test afgesproken aantal eenheden stollingsfactor op, welke door de arts ingevuld is op het werkprotocol
- neem uit het infuus een dalspiegel + antistoffen af (2 x citraatbuis 2ml)
- spuit vervolgens het aantal afgesproken eenheden stollingfactor per push I.V.
- daarna op afgesproken tijden factorspiegels afnemen (1 x citraatbuis), zie hiervoor onderstaand schema
- vooraf aan bloedafnames voldoende bloed uit infuus afnemen met dummy-buis voordat citraatbuis wordt afgenomen

Datum					
Afnametijd	0	30'	4 uur	24 uur	48 uur
Nummer afname	I	II	III	IV	V
afgehandeld					

LET OP:

- zet op stollingsaanvraag brieven de juiste tijden en toegediende aantal eenheden stollingspreparaat en welk preparaat gegeven is
- nummering op de spuiten duidelijk vermelden
- alle monsters direct opsturen naar het lab
- vraag bij ouders na of ze weten wanneer de volgende afname op de poli plaatsvindt
- met ouders en de jongens overleggen of ze het naaldje willen laten zitten of dat ze op de poli opnieuw geprikt willen worden.
- Heparine slotje maken of infuus verwijderen.