



Moederprotocol IHEM CLL Rituximab IV

Naam Behandelplan:	IHEM CLL Rituximab IV	
Synoniemen:	Rituximab	
Indicatie:	Chronische lymfatische Leukemie (CLL)	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	6	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	1 ^e kuur (langzame): 360 min 2 ^e kuur (snelle): 210 min	
Facturerings indicatie:	Afhankelijk van indicatie	
Zorgactiviteit:	339966F	immunotherapie
Bron		

Let op bij indicatie NHL: zie ander moederprotocol!

Cyclus 1

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli											
				Dag	1	2	3	4	5	6	7	8			
Chemotherapie															
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9%	375 mg/m ²	IV	Volgens opbouwschema *	X											
Pre- medicatie/ anti-emetica															
PREDNISOLON	25mg	IV	Bolus	X											
CLEMASTINE	2mg	IV	Bolus	X											
PARACETAMOL	1000mg	PO		X											
Thuis in te nemen medicatie															
Allopurinol (bij eerste cyclus)	300 mg	PO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

* Opbouwschema Rituximab CLL cyclus 1

Stap 1: 33 ml/uur TIV 50 (90 min)

Stap 2: 50 ml/uur TIV 50 (60 min)

Stap 3: 100ml/uur TIV 50 (30 min)

Stap 4: gedurende 1 uur rest van het infuus laten inlopen.

Vanaf cyclus 2

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli											
				Dag	1	2	3	4	5						
Chemotherapie															
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9%	500 mg/m ²	IV	Volgens opbouwschema**	X											
Pre- medicatie/ anti-emetica															
PREDNISOLON	25mg	IV	Bolus	X											
CLEMASTINE	2mg	IV	Bolus	X											
PARACETAMOL	1000mg	PO		X											

** Opbouwschema Rituximab CLL cyclus 2

Stap 1: 100 ml/uur TIV 50 (30 min)

Stap 2: gedurende 1 uur rest van het infuus laten inlopen.



Patiëntinformatie:

- Huidafwijkingen
- Tekort aan witte bloedcellen
- Hoofdpijn
- Infecties
- Koorts
- Infuusreacties

Afspraken									
Cyclus/dag	C0D1	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1
Arts	X		X		X		X		X
Verpleegkundig specialist	X			X		X		x	
Dagcentrum afspraak		X	x	x	x	x	x	x	x

Lab		
Cyclus/dag	C1D1	C2D1 t/m C18D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X
LDH	X	X
ALAT	X	X
Kreatinine	X	X
Neutro (absoluut)	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X	
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X	
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X	
OncoLifeS Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag	X	

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Algemeen 9	<ul style="list-style-type: none"> • Indien de Rituximab klinisch gegeven wordt pas de Rituximab order aan naar de klinische variant d.m.v. orders toevoegen en vervolgens een order te selecteren uit het bouwblok Rituximab klinisch die (niet geselecteerd) opgenomen is in het protocol.
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	<ul style="list-style-type: none"> • Bij eerdere overgevoeligheidsreacties en/of lymfoomcellen > 5 x 10⁹/l : steeds langzame schema voorschrijven.

Toegangsweg
Perifeer



Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver.
Toedieninstructie 6	30 minuten wachten na toediening premedicatie.
Algemeen 20	<p>Complicatie tijdens Rituximab: Indien complicaties optreden tijdens inlopen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zet lijn Rituximab stop - Sluit infuussysteem met NaCl 0,9% aan en zet de lijn open - Laat een collega de specialist en arts assistent waarschuwen - Doe controles: RR, Pols, Temperatuur. Gedurende de rest van de controles a 15 min. Tot 1 uur na het inlopen van het infuus. - Bed in Trendelenburg - In overleg met specialist: indien na enige tijd de klachten verdwijnen of verminderen mag de toediening worden hervat met de helft van de voorgaande infusiesnelheid. <p>Bij eerdere overgevoelighedsreacties: steeds toedienen volgens het langzame schema.</p>

Vitale gegevens			
	RR	HR	Temp
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X

Spoedmedicatie Ja
