



IHEM CLL RITUXIMAB IDELALISIB

Naam Behandelplan:	IHEM CLL Rituximab Idelalisib	
Synoniemen:	CLL, VENETOCLAX	
Indicatie:	CLL	
Cyclus duur:	14 dagen	
Totaal aantal cycli:	8	
Toedienlocatie:	Dagcentrum	
Behandelduur:	C1: 360 min C2 t/m C8 210 min	
Bron		
Zorgactiviteit:	339966F	Immunotherapie



IHEM CLL RITUXIMAB IDELALISIB

C1

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli (Dag van transplantatie is in principe dag 0)										
				Dag	1	2	3	4	5	6	7	8		14
Chemotherapie														
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9%	375 mg/m ²	IV	Volgens opbouwschema *	X										
IDELALISIB	2 dd 150 mg	PO		X										
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Allopurinol	300 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Co-trimoxazol	480 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pre- medicatie/ anti-emetica														
PREDNISOLON	25 mg	IV	Bolus	X										
CLEMASTINE	2 mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000 mg	PO		X										

*** Opbouwschema Rituximab CLL cyclus 1**

Stap 1: 33 ml/uur TIV 50 (90 min)

Stap 2: 50 ml/uur TIV 50 (60 min)

Stap 3: 100ml/uur TIV 50 (30 min)

Stap 4: gedurende 1 uur rest van het infuus laten inlopen.



C2 t/m C8

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli (Dag van transplantatie is in principe dag 0)										
				Dag	1	2	3	4	5	6	7			14
Chemotherapie														
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9%	500 mg/m ²	IV	Volgens opbouwschema**	X										
IDELALISIB	2 dd 150 mg	PO		X										
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Co-trimoxazol	480 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pre- medicatie/ anti-emetica														
PREDNISOLON	25 mg	IV	Bolus	X										
CLEMASTINE	2 mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000 mg	PO		X										

** Opbouwschema Rituximab CLL vanaf cyclus 2 en verder

Stap 1: 100 ml/uur TIV 50 (30 min)

Stap 2: gedurende 1 uur rest van het infuus laten inlopen.



IHEM CLL RITUXIMAB IDELALISIB

Patiënt informatie:

- Huidproblemen
 - huiduitslag
 - jeuk

- Minder bloedcellen
 - Tekort aan bloedplaatjes
 - tekort aan witte bloedcellen
- Infecties
- Infuusreacties
- Koorts
- Maag-darmklachten
 - misselijk zijn en overgeven
 - diarree
- Leverproblemen

Afspraken		
Cyclus/dag	C1 t/m C8*	C8D52
Arts	X	X
Verpleegkundig specialist	X	
Dagcentrum afspraak	X	

* Alternierend afspraak bij ARTS/VS



IHEM CLL RITUXIMAB IDELALISIB

Lab			
Cyclus/dag	COD1	C1 t/m C8	C8D42
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo		X	X
Abs neutro		X	
Handdiff			X
LDH		X	X
Natrium			X
Kalium		X	X
Fosfaat			X
Calcium			X
ALAT		X	X
ASAT			X
GGT			X
AF			X
Totaal bilirubine			X
Kreatinine		X	X
Urinezuur		X	X
CMV PCR		X	
Hepatitis serologie screening	X		
Anti HIV + P24 antig (combo)	X		
Flowcytometrie bloed			X

Beeldvorming/overig	
Cyclus/ dag	C24 D42
CT HTA	X



Zorgverlener communicatieorders	
Beleid bij TLS	

Verpleegkundige orders	
Toedieninstructie 6	30 minuten wachten na toediening premedicatie 1 ^e cyclus
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab
Vitale gegevens	RR, HF en Temp meten

Vitale gegevens (poliklinisch)			
	RR	HR	TEMP
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X

Spoedmedicatie
Ja

Toegangsweg
Perifeer