



Moederprotocol IHEM NHL Rituximab

Naam Behandelplan:	IHEM NHLB Rituximab	
Synoniemen:	Rituximab	
Indicatie:	Lymfatische (B-cel) - maligniteiten	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	Indien wekelijks: 6 Maintenance a 2 maanden: 18 Maintenance a 3 maanden: 8	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	1 ^e kuur (langzame): 360 min 2 ^e kuur (snelle): 150 min	
Facturerings indicatie:	Afhankelijk van indicatie	
Zorgactiviteit:	339966F	immunotherapie
Bron		

Let op bij indicatie CLL: zie ander moederprotocol!



Moederprotocol IHEM NHL Rituximab

Cyclus 1

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli										
				Dag	1	2	3	4	5					
Chemotherapie														
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9%	375 mg/m ²	IV	Volgens opbouwschema *	X										
Pre- medicatie/ anti-emetica														
PREDNISOLON	25mg	IV	Bolus	X										
CLEMASTINE	2mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000mg	PO		X										

* Opbouwschema Rituximab NHL cyclus 1 (langzaam)

Stap 1: 33 ml/uur TIV 50 (90 min)

Stap 2: 50 ml/uur TIV 50 (60 min)

Stap 3: 100 ml/uur TIV 50 (30 min)

Stap 4: gedurende 1 uur rest van het infuus laten inlopen.

Indien patiënt in het afgelopen jaar al Rituximab heeft ontvangen en geen infusiereactie heeft gehad mag het snelle toedieningschema worden gebruikt, zie cyclus 2.

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli										
				Dag	1	2	3	4	5					
Chemotherapie														
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9%	375 mg/m ²	IV	Volgens opbouwschema *	X										
Pre- medicatie/ anti-emetica														
PREDNISOLON	25mg	IV	Bolus	X										
CLEMASTINE	2mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000mg	PO		X										

Vanaf cyclus 2

* Opbouwschema Rituximab NHL cyclus 2 (snel)

Stap 1: 60 ml/uur TIV 10 (10min)

Stap 2: Gedurende 50 minuten rest van het infuus laten inlopen.

Patiëntinformatie:

- Huidafwijkingen
- Tekort aan witte bloedcellen
- Hoofdpijn
- Infecties
- Koorts
- Infusreacties



Afspraken									
Cyclus/dag	C0D1	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1 – C18D1
Arts	X		X		X		X		X
Verpleegkundig specialist	X			X		X		x	
Dagcentrum afspraak		X	x	x	x	x	x	x	x

Lab		
Cyclus/dag	C1D1	C2D1 t/m C18D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X
LDH	X	X
ALAT	X	X
Kreatinine	X	X
Neutro (absoluut)	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X	
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X	
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X	
OncoLifeS Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag	X	

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Algemeen 9	<ul style="list-style-type: none"> Indien de Rituximab klinisch gegeven wordt pas de Rituximab order aan naar de klinische variant d.m.v. orders toevoegen en vervolgens een order te selecteren uit het bouwblok Rituximab klinisch die (niet geselecteerd) opgenomen is in het protocol.
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	<ul style="list-style-type: none"> Bij eerdere overgevoelighedsreacties en/of lymfoomcellen > 5 x 10⁹/l : steeds langzame schema voorschrijven.

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver.
Algemeen 20	<p>Complicatie tijdens Rituximab:</p> <p>Indien complicaties optreden tijdens inlopen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zet lijn rituximab stop Sluit infuussysteem met NaCl 0,9% aan en zet de lijn open Laat een collega de specialist en arts assistent waarschuwen Doe controles: RR, Pols, Temperatuur. Gedurende de rest van de controles a 15 min. Tot 1 uur na het inlopen van het infuus. Bed in Trendelenburg In overleg met specialist: indien na enige tijd de klachten verdwijnen of verminderen mag de toediening worden hervat met de helft van de voorgaande infusiesnelheid. <p>Bij eerdere overgevoelighedsreacties: steeds toedienen volgens het langzame schema.</p>



Vitale gegevens meten				
Eenmalig, start na vrijgave .	RR	HR	Temp	
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X	

Toegangsweg	
Perifeer	

Spoedmedicatie Ja
