

## IHEM NHL Tafasitamab CU



Naam Behandelplan:	IHEM NHLB Tafasitamab (CU)	
Synoniemen:	Tafasitamab	
Indicatie:	Lymfatische (B-cel) - maligniteiten	
Cyclus duur:	28 dagen	
Totaal aantal cycli:	12	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	C1D1: 315 min C1D4,8: 285 min Vanaf C1D15: 210 min	
Facturerings indicatie:	Afhankelijk van indicatie	
Zorgactiviteit:	339966F	immunotherapie
Bron		





## Cyclus 4 en verder

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/snelheid	Dagen/ dag cycli											
				Dag	1	2	3	4	5		15			28	
Chemotherapie															
<b>TAFASITAMAB CU</b> In 271 ml NaCl 0,9%	12 mg/kg	IV	125 ml/uur*	X									X		

## Vanaf gift 2

\*maximale inlooptijd 2,5 uur.

## Patiëntinformatie:

- Tekort aan witte, rode bloedcellen of bloedplaatjes
- Infecties
- Vermoeidheid/zwakte
- Verminderde eetlust
- Diarree
- Hoesten
- Koorts
- Zwelling van onderbenen of handen

Afspraken					
Cyclus/dag	C1 t/m 12 D1*	C1D4	C1 t/m 3 D8	C1 t/m 12 D15	C1 t/m 3 D22
Arts	X				
Verpleegkundig specialist	X				
Dagcentrum afspraak	X	X	X	X	x

\* dag 1 van alle cycli alternerend afspraak arts/VS

Lab		
Cyclus/dag	C1D1	Alle overige cycli D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X
LDH	X	X
ALAT	X	X
Kreatinine	X	X
Neutro (absoluut)	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X	
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X	
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X	
OncoLifeS Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag	X	



Zorgverlener communicatieorders	
Beleid bij TLS	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als trombocytenaantal onder 50.000/<math>\mu</math>l komt:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderbreek toediening van tafasitamab en lenalidomide.</li> <li>Voer wekelijks bepalingen van het volledige bloedbeeld uit tot trombocyten terugkeren naar <math>\geq</math> 50.000/<math>\mu</math>l.</li> <li>Hervat tafasitamab met dezelfde dosis en lenalidomide op een lagere dosis als trombocyten terugkeren naar <math>\geq</math> 50.000/<math>\mu</math>l.</li> </ul> </li> <li>Als het aantal neutrofielen daalt tot <math>&lt;</math> 1.000/<math>\mu</math>l gedurende <math>\geq</math> 7 dagen, tot <math>&lt;</math> 1.000/<math>\mu</math>l met een stijging van de lichaamstemperatuur tot <math>\geq</math> 38,0 °C, of tot <math>&lt;</math> 500/<math>\mu</math>l:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderbreek toediening van tafasitamab en lenalidomide.</li> <li>Voer wekelijks bepalingen van het volledige bloedbeeld uit.</li> <li>Overweeg gebruik van groeifactoren en/of antimicrobiële middelen conform lokale richtlijnen.</li> <li>Hervat tafasitamab met dezelfde dosis en lenalidomide op een lagere dosis als neutrofielen herstellen naar <math>\geq</math> 1.000/<math>\mu</math>l.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indien infusiereactie bij eerder giften, dan handmatig premedicatie toevoegen.</li> </ul>

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoeligheidsreacties
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met voorschrijver.
Toedieninstructie 6	30 minuten wachten na toediening premedicatie bijg.
Algemeen 20	<p>Complicatie tijdens Tafasitamab :</p> <p>Indien complicaties optreden tijdens inlopen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zet lijn Tafasitamab stop</li> <li>Sluit infuussysteem met NaCl 0,9% aan en zet de lijn open</li> <li>Laat een collega de specialist en arts assistent waarschuwen</li> <li>Doe controles: RR, Pols, Temperatuur. Gedurende de rest van de controles a 15 min. Tot 1 uur na het inlopen van het infuus.</li> <li>Bed in Trendelenburg</li> <li>In overleg met specialist: indien na enige tijd de klachten verdwijnen of verminderen mag de toediening worden hervat met de helft van de voorgaande infusiesnelheid.</li> <li>Als de symptomen van de patiënt binnen een uur niet terugkeren en vitale functies stabiel zijn, kan de infusiesnelheid elke 30 minuten worden opgehoogd, zolang dit wordt verdragen, tot de uitgangssnelheid.</li> </ul> <p>Bij eerdere overgevoeligheidsreacties: steeds toedienen volgens het langzame schema.</p>

Vitale gegevens meten				
Eenmalig, start na vrijgave .	RR	HR	Temp	
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X	

Toegangsweg
Perifeer



Spoedmedicatie Ja