

D.D.A.V.P. (Minrin / Desmopressineacetaat) test

(1ml = 4µg)

Voor patiënten met milde Hemofilie en Von Willebrand

PATIENTGEGEVENS:

Sticker patiënt

Product **DDAVP**

Hoeveelheid µg voor behandeling / test

..... microgram (µg)

Gewicht patiënt:kg

Handtekening aanvragend en voorschrijvend arts.....

INDICATIE:

- Testen van het effect van DDAVP
- Behandeling of voorkomen van bloedingen bij patiënten die reageren op D.D.A.V.P.

KLAARZETTEN:

- D.D.A.V.P. voor I.V.
- Zakje NaCl 0.9 %
- Materialen voor infuus

VOORBEREIDING:

D.D.A.V.P is een antidiuretisch hormoon dat door de hypofyse gemaakt wordt. Het kan bij patiënten met hemofilie (uitgezonderd de ernstige vormen) of Morbus von Willebrand (bepaalde vormen) gebruikt worden omdat D.D.A.V.P. naast het anti- diurese effect ook het Factor VIII en VWF gehalte in het bloed verhoogt.

BIJWERKINGEN: Vooraf bespreken!

Milde	*	Rood hoofd, 'opvliegers'
	*	Hoofdpijn
	*	Misselijkheid
	*	Buikpijn
	*	Hartkloppingen
	*	Andere klachten
	→	Inloopsnelheid halveren (noteren op daglijst en in dossier)

Ernstige	*	Pijn op de borst
	*	Hypotensie + snelle hartactie
	→	Infuus stopzetten, maar niet verwijderen !!!
	→	arts waarschuwen

DOSERING DDAVP: 0.3 microgram / kg
(ampullen van 1ml = 4µg)

UITVOERING:

1. Patiënt voorlichten, wegen en RR meten
2. Maak in opdracht van de arts (groene lijst) een D.D.A.V.P.infuus; D.D.A.V.P. oplossen in 50 ml NaCl 0,9%
3. Indien bloedafnames nodig zijn (opdracht arts in OMAF): zorg voor monsteretiketten; de bepalingen kunnen zijn: bloedgroep, FVIIIc, VWFag en/of VWFrcf
4. Breng een infuus in
5. Geef de D.D.A.V.P in 30 minuten I.V.
6. Meet RR halverwege en aansluitend van de toediening
7. Sluit na inlopen D.D.A.V.P.infuus een waaknaaldje aan.
8. Laat de patiënt nog 30 minuten na inlopen D.D.A.V.P.infuus op de poli om eventuele "late" effecten te kunnen opvangen
9. Meet nogmaals de RR; indien RR goed mag infuus uit. Bij Lage RR contact met arts.
10. Verwijder het infuus.
11. Informeer de patiënt en ouders:
 - dat kind vocht kan vasthouden en dat hij/zij de tot 8 uur na de DDAVP gift niet teveel mag drinken
hoeveelheid vochtinname aan de hand van de hoeveelheid plassen
 - dat kind een opgeblazen gevoel kan hebben,
 - dat hoofdpijn voor kan komen,
 - dat het warmte gevoel naar verloop van een aantal uur zal verdwijnen.
 - Zo nodig mag Paracetamol gegeven worden.
12. Patiënt kan naar huis.

AANDACHTSPUNTEN:

- duidelijk arts vermelden met pieper-nr. i.v.m. mogelijke reacties
- indien infuus langere inloopsnelheid heeft gehad, tijden aanpassen
- Bevindingen noteren in dossier

Schematisch:

Tijd	handeling	bloedafname	Paraaf
0 =	bloedafname RR meten Infuus inbrengen DDAVP aanhangen	T=0	
15' =	RR meten		
30' =	RR meten Waaknaaldje plaatsen		
60' =	RR meten bloedafname	T=60	
240' =	RR meten bloedafname - Infuus verwijderen en patiënt kan naar huis - Of arts waarschuwen	T=240	