



IHEM CLL Venetoclax hoog risico TLS

Naam Behandelplan:	IHEM CLL venetoclax hoog risico TLS	
Synoniemen:	CLL, VENETOCLAX	
Indicatie:	Recidief/Refractair CLL (met 17p deletie en/of TP53 mutatie)	
Cyclus duur:	Ramp-up week 1 t/m 5: 7 dagen Vanaf week 6: 28 dagen	
Totaal aantal cycli:	24	
Toedienlocatie:	Klinisch	
Behandelduur:	Ramp-up week 1 t/m 5: opname Week 6 en verder: poliklinisch	
Bron	J.F. Seymour, et al. NEJM 2018; 378: 1106-1120.	
Zorgactiviteit:	339968G	immunotherapie (oraal)



IHEM CLL Venetoclax hoog risico TLS

Ramp- up fase week 1 t/m 5

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli (Dag van transplantatie is in principe dag 0)										
				Dag	1	2	3	4	5	6	7			
Chemotherapie														
Week 1 VENETOCLAX	20 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 2 VENETOCLAX	50 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 3 VENETOCLAX	100 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 4 VENETOCLAX	200 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 5 VENETOCLAX	400 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Allopurinol	300 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hydratie														
Nacl 0,9%	3000 ml/24 uur	IV	8 uur per 1000 ml	X										



IHEM CLL Venetoclax hoog risico TLS

Week 6 en verder

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli (Dag van transplantatie is in principe dag 0)										
				Dag	1	2	3	4	5	6	7			28
Chemotherapie														
VENETOCLAX	Dag 1 t/m 28: 400 mg dd	PO		X										
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Allopurinol	300 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Patiënt informatie:

- Longklachten
- Maag-darmklachten
 - misselijk zijn en overgeven
 - diarree
 - verstopping
- Minder bloedcellen
 - bloedarmoede
 - tekort aan witte bloedcellen
- Moe zijn
- Tumorlyssyndroom



IHEM CLL Venetoclax hoog risico TLS

Afspraken		
Cyclus/dag	Ramp-up week 1 t/m 5	Week 6 en verder*
Arts		X
Verpleegkundig specialist		X
Opname order nodig	X	

* Alternierend afspraak bij ARTS/VS

Lab				
Cyclus/dag	Week 1 t/m 5 D1 bij opname	Week 1 t/m 5 D1 6-8 uur na venetoclax	Week 1 t/m 5 D2 24 uur na venetoclax	Week 6
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X			X
LDH	X	X	X	X
ALAT	X			X
Calcium	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X
Fosfaat	X	X	X	X
Kalium	X	X	X	X
Natrium	X	X	X	X
Urinezuur	X	X	X	X

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Algemeen 18	Indien urinezuur verhoogd (>0,3 mmol/ml), dan rasburicase toevoegen onder orders en allopurinol verwijderen

Verpleegkundige orders	
Opstarten Casemanagement	Belt de verpleegkundig specialist (46260) voor het opstarten van casemanagement. Indien patiënt in het weekend gestart met de



IHEM CLL Venetoclax hoog risico TLS

	behandeling, de MMA vragen op maandag de bellen.
Afnemen MEWS	Elke dag om 8:00
Vitale gegevens	3 keer per dag temp
Gewicht meten	Elke dag om 8:00
Algemeen 19	Prikken uitgebreid lab voor inname van venetoclax, 6-8 uur na inname en 24 uur na inname venetoclax.

Vitale gegevens						
	RR	Pols	SpO2	AF	temp	gewicht
6:00/12:00/20:00					X	

Behandelplan notitie

Spoedmedicatie Ja

Toegangsweg
Perifeer