



IHEM CLL venetoclax intermediar/ laag risico TLS

Naam Behandelplan:	IHEM CLL venetoclax intermediar/ laag risico TLS	
Synoniemen:	CLL, VENETOCLAX	
Indicatie:	CLL	
Cyclus duur:	Ramp-up week 1 t/m 5: 7 dagen Vanaf week 6: 28 dagen	
Totaal aantal cycli:	6	
Toedienlocatie:	Poliklinisch	
Bron	J.F. Seymour, et al. NEJM 2018; 378: 1106-1120.	
Zorgactiviteit:	339968G	immunotherapie (oraal)



IHEM CLL venetoclax intermediar/ laag risico TLS

Ramp- up fase week 1 t/m 5

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli (Dag van transplantatie is in principe dag 0)										
				Dag	1	2	3	4	5	6	7			
Chemotherapie														
Week 1 VENETOCLAX	20 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 2 VENETOCLAX	50 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 3 VENETOCLAX	100 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 4 VENETOCLAX	200 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Week 5 VENETOCLAX	400 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X			
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Allopurinol	300 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



IHEM CLL venetoclax intermediar/ laag risico TLS

Week 6 en verder

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli (Dag van transplantatie is in principe dag 0)										
				Dag	1	2	3	4	5	6	7			28
Chemotherapie														
VENETOCLAX	Dag 1 t/m 28: 400 mg dd	PO		X										
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Allopurinol	300 mg dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Patiënt informatie:

- Longklachten
- Maag-darmklachten
 - misselijk zijn en overgeven
 - diarree
 - verstopping
- Minder bloedcellen
 - bloedarmoede
 - tekort aan witte bloedcellen
- Moe zijn
- Tumorlyssyndroom



IHEM CLL venetoclax intermediar/ laag risico TLS

Afspraken		
Cyclus/dag	Ramp-up week 1 t/m 5	Week 6 en verder*
Arts	X	X
Verpleegkundig specialist		X

* Alternerend afspraak bij ARTS/VS

Cyclus/dag	Lab			
	Week 1 t/m 5 D1 Polikliniek	Week 1 en 2 dag 1: 6-8 uur na venetoclax	Week 1 t/m 5 D2 24 uur na venetoclax	Vanaf week 6
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X			X
LDH	X	X	X	X
ALAT	X			X
Calcium	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X
Fosfaat	X	X	X	X
Kalium	X	X	X	X
Natrium	X	X	X	X
Urinezuur	X	X	X	X

Behandelplan notitie
<ul style="list-style-type: none">Instrueer de patient 1,5 – 2 liter per dag te drinken gedurende de gehele opbouwfase