

In studieverband
 Buiten studieverband

CAD
Mobilisatieschema

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:	
	Code kuur E2↓				
	<input type="checkbox"/>	339966A	chemo niet gem		
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2	
Specialisme: IHM Indicatie: mobilisatiekuur voor aferese Multiple Myeloom na inductie therapie met Doxorubicine (bijvoorbeeld TAD/VAD/PAD) Bron: HOVON 65		Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	ja	Dag 1	08.00	Dexamethason	i.v.	40mg		**	**
	ja		09.45-10.00	Uromitexan (Mesna) 4 dd 20mg/kg in 100ml NaCl 0,9% inlooptijd 15 min	i.v.mg		**	**
			10.00-10.30	CYCLOFOSFAMIDE 1000mg/m ² in 100ml NaCl 0,9%	i.v.mg			
			10.45-11.00	DOXORUBICINE 15 mg/m ² in 50 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 15 min	i.v.mg			
	ja		14.00-14.15	Uromitexan (Mesna) 20mg/kg	i.v.mg		**	**
	ja		18.00-18.15	Uromitexan (Mesna) 20mg/kg	i.v.mg		**	**
	ja		22.00-22.15	Uromitexan (Mesna) 20mg/kg	i.v.mg		**	**
	ja	Dag 2	08.00	Dexamethason	i.v.	40mg		**	**
			10.45-11.00	DOXORUBICINE 15 mg/m ²	i.v.mg			
	ja	Dag 3		Dexamethason		40mg		**	**
			10.45-11.00	DOXORUBICINE 15 mg/m ²	i.v.mg			
	ja	Dag 4		Dexamethason		40mg		**	**
			10.45-11.00	DOXORUBICINE 15 mg/m ²	i.v.mg			
	ja	Dag 5 tot einde aferese	21.00	Filgrastim (G-CSF) 10 µg/kg	s.c.µg		**	**

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: (Dag 1 t/m dag 3: start 06.00 uur) 3l Gluc2.5%/NaCl0,45% met per 500 ml:mmol KCl (10 mmol per 500 ml)
		Dag 1 t/m dag 3: Furosemide (lasix) 2dd 5mg push/i.v.
		Dag 1 t/m 5 Ondansetron (Zofran)2dd 8 mg/i.v.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Filgrastim (G-CSF): start op dag 5, 1 x daags tot einde aferese (injectiespuit: 300 en 480µg)
		Bloedproducten bestralen.

MEDISCHE INSTRUCTIES

- Perifeer infuus
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Maatregelen mbt Cyclofosfamide en risico hemorrhagische cystitis
 - Pas starten met Cyclofosfamide als diurese > 150 ml/h.
 - Als urine productie < 600 ml, in eerste 4u na Cyclofosfamide: Bladderscan en bij retentie katheter. Tevens overleg met arts.
 - Patiënt moet elke 2 uur urineren, tot ten minste 8u na Cyclofosfamide
 - Wegen voor en 12u na Cyclofosfamide: als gewicht > 2kg gestegen is overleg!
 - Hydratie stopt 48 uur na laatste gift Cyclofosfamide.
 - Zo nodig blaaskatheter geven.
 - Mesna en spoelschema mag samen lopen.
- CAVE extravasatie tav doxorubicine
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 6 dagen na de laatste gift Doxorubicine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks 2 x daags wegen ten behoeve van vochtbalans, eventueel extra Furosemide laten afspreken door arts.
- Mondverzorging.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Cyclofosfamide: (Synoniem: CTX, Endoxan)

- Cytostaticum behorende tot de alkylerende middelen.
- Cyclofosfamide bij voorkeur in de ochtend toedienen, zodat de metabolieten zijn uitgescheiden voor de nacht.

Bijwerkingen: beenmergdepressie, maagdarfstoornissen, haaruitval, complicaties van nieren en urinewegen (zoals hematurie, oedeem, bloeding, ontsteking, fibrose, sclerose, hemorragische necrotiserende cystitis)

Adriamycine (Synoniem: Doxorubicine, Adriamycine)

- Cytostaticum behorende tot de antibiotica. Verstoort het mitoseproces; de vroege profase door lage doses, de mitose door hoge doses. De nucleïnezuursynthese (DNA, RNA) wordt geremd.
- Bijwerkingen: beenmergdepressie, maag-darfstoornissen, alopecia, mucositis. Kans op cardiomyopathie.
- Stel de patiënt gerust wat betreft mogelijk roodgekleurde urine. Adviseer de patiënt de eerste 48 uur na infusie geen contactlenzen te dragen.