

In studieverband
 Buiten studieverband

**HD-Ara-C
 consolidatie kuur
 HOVON 105**

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

| | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Patiëntsticker: | Datum aanvraag | Afdeling | 12-NAT: | Gefaxt naar apotheek Ja/Nee |
| | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Lich.opp (m2) | Pat.studienr: |
| | Code kuur E2↓ | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 339966A | chemo niet gem | |
| | Naam + paraaf arts | Naam + paraaf supervisor | Naam + paraaf VPK1 | Naam + paraaf VPK2 |
| Specialisme: IHM Indicatie: Primair CNS Lymfoom 18-70 jaar bij CR/PR Start: 4-6 weken na laatste HD-MTX (2 ^e (R)MBVP) indien ANC > 1.5x10 ⁹ /l en Tr > 100 x 10 ⁹ /l Bron: HOVON 105 PCNSL/ALLG NHL 24 | Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:% (vul in percentage en middel) Nierfunctie (MDRD): Leverfunctie: normaal/afwijkend Bij klaring < 50, bilirubine > 25 en/of ASAT > 45 (i.p.) dosisaanpassing, zie hematologiegroningen.nl | | | |

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

| Datum | In EVS plaatsen | Dag | Tijden | GENEESMIDDEL | TW * | Dosis | Pompstand | Paraaf 1 | Paraaf 2= aanhangen |
|-------|-----------------|-------|-------------|---|------|---------|-----------|----------|---------------------|
| | | Dag 1 | 09.00-09.30 | CYTARABINE (2dd 2000 mg/m ²) in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 30 min | i.v. |mg | | | |
| | | | 21.00-21.30 | CYTARABINE 2000 mg/m ² | i.v. |mg | | | |
| | | Dag 2 | 09.00-09.30 | CYTARABINE 2000 mg/m ² | i.v. |mg | | | |
| | | | 21.00-21.30 | CYTARABINE 2000 mg/m ² | i.v. |mg | | | |

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

| Datum | Paraaf arts zodra in EVS geplaatst | Hydratieschema/ medicatie |
|-------|------------------------------------|---|
| | | Hydratie: 1L Gluc2.5%/NaCl0,45% |
| | | Dag 1 en 2: Ondansetron (zofran) 2dd 8 mg i.v./p.o. |
| | | Hypromellose 0,3% oogdruppels 6dd. Start dag 1 tot regeneratie |
| | | Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze) |
| | | Igv mucositis Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v. tot herstel neutropenie |
| | | S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl |
| | | Valaciclovir (Zelitrex) 2dd500mg tot herstel neutropenie |

MEDISCHE INSTRUCTIES

- Perifeer infuus
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- **Indien in studie voor start kuur: neurologisch onderzoek (incl. MMSE+RTOG), oogheelkundig onderzoek indien postief bij screening, MRI cerebrum**
- Kuur alleen starten indien $ANC > 1.5 \times 10^9$ en Trombo's $> 100 \times 10^9$ (binnen 6 weken na laatste HD-MTX gift)
- Evt. start G-CSF (inkorten neutropene periode)

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. ARA-C.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels).
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 3 dagen na de laatste gift Cytarabine worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositisscore bijhouden.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Cytarabine (ARA-C)

Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C

- Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metaboliëten.
- Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, afhankelijk van de hoogte van de dosering en toedieningswijze leverfunctiestoornissen, koorts, stomatitis, haaruitval, anorexie, diarree bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels)