

In studieverband :.....

Buiten studieverband

**ABVD**

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )	
	Code kuur E2:	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: Hodgkin lymfoom Cyclusduur: 4 weken Totaal: wisselend Bron:	Afspraakcodes DC: ABVD: 3 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

**Opmerkingen:**

**Kuurnummer:** .....

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1						a.		
	1		ONDANSETRON	iv	8 mg		bolus		
	1		DEXAMETHASON	iv	4 mg		bolus		
	1	00:15	<b>DOXORUBICINE</b> 25 mg/m <sup>2</sup> in 50 ml NaCl 0,9%	iv	... mg		b.c. in folie, in max. 15 min.		
	1	00:15	<b>VINBLASTINE</b> 6 mg/m <sup>2</sup> in 50 ml NaCl 0,9%	iv	... mg		c. in max. 15 min.		
	1	00:30	<b>BLEOMYCINE</b> 10 USP-E/m <sup>2</sup> in 50 ml NaCl 0,9%	iv	... USP-E				
							Nieuwe infuuslijn met licht werend systeem.		
	1	01:00	<b>DACARBAZINE</b> 375 mg/m <sup>2</sup> in 500 ml NaCl 0,9%	iv	.... mg		c.d. in folie		

**Verpleegkundige toedien-instructies**

- a. Prik het infuus met een roze naald in een grote vene.
- b. Bij infusie via CVK: spoel CVK vooraf met 50 ml infusievloeistof.
- c. Kies voor een infusiesnelheid afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene..
- d. Bedek de infuusarm met een (fleece)deken.
- Screen op ondervoeding: neem de MUST af.

patiëntensticker

Kuurnummer: .....

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	15						<i>a.</i>		
	15		ONDANSETRON	iv	8 mg		bolus		
	15		DEXAMETHASON	iv	4 mg		bolus		
	15	00:15	<b>DOXORUBICINE</b> 25 mg/m <sup>2</sup> in 50 ml NaCl 0,9%	iv	... mg		<i>b.c.</i> in folie, in max. 15 min.		
	15	00:15	<b>VINBLASTINE</b> 6 mg/m <sup>2</sup> in 50 ml NaCl 0,9%	iv	... mg		<i>c.</i> in max. 15 min.		
	15	00:30	<b>BLEOMYCINE</b> 10 USP-E/m <sup>2</sup> in 50 ml NaCl 0,9%	iv	... USP-E				
							Nieuwe infuuslijn met licht werend systeem		
	15	01:00	<b>DACARBAZINE</b> 375 mg/m <sup>2</sup> in 500 ml NaCl 0,9%	iv	... mg		<i>c.d.</i> in folie		

#### Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Prik het infuus met een roze naald in een grote vene.
- *b.* Bij infusie via CVK: spoel CVK vooraf met 50 ml infusievloeistof.
- *c.* Kies voor een infusiesnelheid afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.
- *d.* Bedek de infuusarm met een (fleece)deken.

patiëntensticker

## Achtergrondinformatie ABVD

### Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Hodgkin lymfoom
- Indicatie: Hodgkin lymfoom
- De arts kan overwegen een VAP te laten plaatsen.
- Modificatie 100% dosering gehele kuur voor 1e kuur onafhankelijk van bloeuitslagen. Ook dag 15 volle dosis tenzij CTCEA graad 4 of hoger. Volgende kuur dag 28 op geleide van bloedbeeld):

Leuko $\times 10^9 /l$	trombo $\times 10^9 /l$	A	B	V	D
> 2,5	> 80	100 %	100 %	100 %	100 %
< 2,5	< 80	uitstel			

- Modificatie 100% dosering op geleide van bloedbeeld bij begin van de volgende kuur: Leukocyten > 2.5, en trombocyten > 80. Indien niet de volledige dosis mogelijk, 3,7,10 of 14 dagen uitstellen. Zodra herstel is opgetreden volledige dosis hervatten. Indien herstel na 2 week uitstel de waarden niet zijn hersteld dan 25% dosis reductie A,V, D.  
N.B. Granulocytopenie alleen is geen reden tot uitstel.

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Doxorubicine: Cytostaticum behorende tot de antibiotica.
- Vinblastine: Antimitotisch cytostaticum behorende tot de vinca-alkaloïden.
- Bleomycine: Cytostaticum behorende tot de antibiotica.
- Dacarbazine: Cytostaticum behorende tot de alkylerende stoffen.
  - De irritaties rond de aanprikplaats en sommige systemische bijwerkingen worden toegeschreven aan de vorming van fotodegradatieproducten.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Doxorubicine:  
Stel de patiënt gerust wat betreft mogelijk roodgekleurde urine.  
Adviseer de patiënt de 1<sup>e</sup> 48 uur na infusie geen contactlenzen te dragen.
- Bleomycine:  
Koorts kan optreden 2 tot 6 uur na de 1<sup>e</sup> gift. Het vóórkomen van het ontstaan van koorts neemt af bij daaropvolgende infusen.  
Huid- en nagelveranderingen; pigmentaties in de huidplooiën en op drukplaatsen kunnen vóórkomen. Deze donkere huidverkleuring blijft vele jaren zichtbaar. Oppassen met krabben op de huid. Dit kan jarenlange strepen geven.
- Dacarbazine:  
Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.  
Geef de volgende adviezen (Zie ook SOP):
  - 4-6 glazen drinken de avond of de ochtend voor de infusie;
  - warm kleden, eventueel gebruik van extra deken tijdens infusie;
  - infuusarm tegen licht beschermen;
  - patiënten die zelf gevoelig zijn voor licht, aanraden zonlicht te vermijden tijdens en na toediening.

patiëntensticker

**Co-medicatie** - recepten via arts (geen EVS)

- Ondansetron, dag 1 en 15: 's ochtends 1 x 8 mg/p.o. of i.v. voor infuus. 's Avonds 8 mg/p.o.
- Ondansetron, dag 2 en 16: 's ochtends 8 mg/p.o./z.n.
- Ondansetron, evt. 2 x dd 8 mg/p.o. zolang als nodig is: max. 3 dagen
- Duphalac, 3 x dd 5-15 ml/p.o. ter voorkoming van obstipatie