

In studieverband
 Buiten studieverband

HDM met ASCT
AL-Amyloïdose

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: AL- Amyloïdose 18 – 70 jaar Cyclusduur: dit schema starten 2 tot max. 6 weken na stamcelafereze Totaal: 1 Bron: HOVON 104	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

kuur (dag -3) niet starten op woensdag of donderdag

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp-stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	Dag -4		Time out procedure					
			plaatsen CVK					
	Dag -3	10.00-10.30 *IJs in de mond	MELFALAN * 1 x 100 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 30 min	i.v.	mg			
	Dag -2	10.00-10.30	MELFALAN * 1 x 100 mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag -1		rustdag					
	Dag 0		TERUGGAVE STAMCELLEN Premedicatie: 1 uur voor teruggave: Solucortef (hydrocortison)	i.v. i.v.	100mg		**	**
			Clemastine (Tavegil)	i.v.	2mg		**	**

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: Eén uur voor voor toediening Melfalan: 500 ml NaCl 0,9% + 20 mmol KCl
		dag -3 en -2: Ondansetron (Zofran) 2dd 8 mg/i.v.
		Dag -3: Aprepitant 125 mg en Dexamethason 12 mg p.o.
		Dag -2 en -1: Aprepitant 80 mg en Dexamethason 8 mg p.o.
		Dag 0: 1 dd 100 mg Soluortef 1 uur voor stamcelteruggave
		Dag 0: 1 dd 2 mg Clemastine 1 uur voor stamcelteruggave
		Start dag 0: Metoclopramide 3dd 10 mg (zn).
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v. Start dag + 1 t/m herstel bloedwaarden (CAVE-ALLERGIE)
		Bloedproducten bestralen tot een jaar na tx
		Valaciclovir (Zelitrex) profylaxe na ontslag, gedurende 3 mnd. (2 dd 500mg/p.o.)

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Bij kreatinine klaring < 40 ml/min. 1 x Melfalan 100 mg/m² alleen op Dag-3
- Vochtbalans aanpassen cq extra lasix geven, o.g.v. diurese, gewicht en RR
- Indien geen inname mogelijk van SDD per os, dan over op i.v.
- Bij penicilline allergie: Bactrimel 3dd 960 mg p.o.
- Herpes profylaxe na ontslag; gedurende 3 maanden Valaciclovir (Zelitrex) 2 x 250 mg/p.o.
- Bij cardiale betrokkenheid van de AL-Amyloïdose dienen de stamcellen op de intensive care onder bewaking te worden toegediend.

TRANSPLANTATIETEAM

- Check: Focus onderzoek: KNO en MHK, Stamceltransplantaat OK?

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Mondhygiëniste inschakelen bij opname voor poetsinstructie en mondverzorging
- Bij *Melfalan toediening en bij spoelen de patiënt ijs in de mond geven.
- Melfalan is onverenigbaar met glucose-oplossingen
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 2 dagen na de laatste gift Melfalan worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.
- Tijd transplantatie staat vermeld in afdelingsagenda, i.p. is standaardtijd autologe transplantatie 10.30 u
- Materiaal klaarzetten voor transplantatie:
 - Dag voor TX: zuigerij (vacuumklok, zuig- en verbindingsslang, yankauer, afzuigpot+zak) O2(O2-klok, O2-masker)
 - Dag van TX: spoedkar in de buurt plaatsen
 - Transplantatielijn zonder filter, gevuld met NaCl 0,9%. Geen bionecteur ertussen.