

Routing HLA typering

1. Indicatie voor allogene stamceltransplantatie
 - a. Zie website: www.hematologiegroningen.nl
 - b. Eventueel besproken in het transplantatieoverleg
2. Aanmelding patiënt via aanmeldingsbrief door hematoloog, fellow of arts-assistent aan transplantatie verpleegkundige
 - a. via polikliniek
 - b. via de verpleegafdeling
3. Transplantatie verpleegkundige neemt contact op met de patiënt, met het verzoek om de gegevens van de sibs te verzamelen. De arts kan de typeringen ordenen in EPD
4. Transplantatie verpleegkundige verstuurt verzoek aan donor voor HLA-typering. Transplantatie verpleegkundige maakt aantekening in het EPD dat HLA typering van de sibs loopt.
5. Donor neemt contact op met transplantatie verpleegkundige. Vervolgens vraagt de transplantatie verpleegkundige HLA typering aan op het laboratorium voor transplantatie immunologie. Transplantatie verpleegkundige regelt het volgende:
 - i. Bloedafname donor (2x 10ml heparine bloed)
 - ii. Bloedafname patiënt (2x 10 ml heparine en 1 x 10 ml stolbloed(zonder gel))
 - iii. Indien nodig opdracht HLA-lab tot versturen van een pakket naar de sib(s)
6. Transplantatie verpleegkundige bespreekt wekelijks met de immunoloog de voortgang.
 - a. *dr. L.B. Bungener vermeld uitslagen HLA-typering*
 - b. *Nieuwe uitslagen worden in transplantatie bespreking besproken*
 - c. *HLA typering van patient en familie worden officieel vermeld in het EPD*
7. Transplantatie verpleegkundige verstuurt brief aan compatibele donoren nadat uitslag HLA typering in EPD staat vermeld.
8. Afspraak maken voor gesprek aspirant donor(en)
 - a. naar aanleiding van brief belt de aspirant donor voor gesprek
 - b. Transplantatie verpleegkundige regelt afspraak met transplantatie arts, aspirant donor en transplantatie verpleegkundige voor gesprek
 - c. Na toestemming aspirant donor, mag patiënt ingelicht worden
9. Na gesprek met aspirant donor(en) verstuurt transplantatie verpleegkundige brieven naar incompatibele donoren
10. Na gesprek met aspirant donor(en) bevestiging gesprek(ken) in status patiënt door transplantatie arts
11. Transplantatie verpleegkundige regelt 2° HLA typering bij donor en patiënt
 - a. 6 weken voor transplantatie
 - i. Voor patiënt. 1 EDTA (10 ml) en 2 heparine (2x 10 ml)
 - ii. Voor donor 1 EDTA buis (10 ml) en 1 heparine (10 ml)