

In studieverband
 Buiten studieverband

Hoge dosis Melfalan met ASCT

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: : Multiple Myeloom 18 -70 jaar Cyclusduur: dit schema starten 4 tot max. 6 weken na stamcelafereze Totaal: 1 Bron: www.hovon.nl/HOVON 95	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

kuur (dag -3)niet starten op dinsdag of woensdag

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp-stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag -4		Time out procedure en plaatsen CVK					
		Dag -3	10.00-10.30 *IJs in de mond	MELFALAN * 1 x 100 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 30 min	i.v.	mg			
		Dag -2	10.00-10.30	MELFALAN * 1 x 100 mg/m ²	i.v.	mg			
		Dag -1		rustdag					
	ja	Dag 0		TERUGGAVE STAMCELLEN Premedicatie: 1 uur voor teruggave: Solucortef (hydrocortison) Clemastine (Tavegil)	i.v. i.v. i.v.	100 mg 2 mg			

patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: één uur voor voor toediening Melfalan: 500 ml NaCl 0,9% + 20 mmol KCl
		Dag -3 en -2: Ondansetron 2 dd 8 mg
		Dag -3: Aprepitant 125 mg en Dexamethason 12 mg p.o.
		Dag -2 en dag -1: Aprepitant 80 mg en Dexamethason 8 mg p.o.
		Metoclopramide 3dd 10 mg (zn).
		Dag 0: 1 dd 100mg Hydrocortison (Solucortef®) 1 uur voor teruggave
		Dag 0: 1 dd 2 mg Clemastine (Tavegil®) 1 uur voor teruggave
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v. Start dag + 1 t/m herstel bloedwaarden (CAVE-ALLERGIE)
		Bestraalde bloedproducten tot 1 jaar na TX
		Valaciclovir (Zelitrex) profylaxe na ontslag, gedurende 3 mnd. (2 dd 500mg/p.o.)

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Bij (geschatte) kreatinineklaring < 40 ml/min, wordt dosisreductie aanbevolen: 1dd 70 mg/m² op dag -3 en -2 (of bij andere comorbiditeit evt nog lager: 100 mg/m² op dag -3 alleen).
- Vochtbalans aanpassen cq extra lasix geven, o.g.v. diurese, gewicht en RR
- Indien geen inname mogelijk van SDD per os, dan over op i.v.
- Bij penicilline allergie: Bactrimel 3dd 960 mg p.o.
- Herpes profylaxe na ontslag; gedurende 3 maanden Valaciclovir (Zelitrex) 2 x 250 mg/p.o.

TRANSPLANTATIETEAM

- Check: Focus onderzoek: KNO en MHK, Stamceltransplantaat OK?

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Mondhygiëniste inschakelen bij opname voor poetsinstructie en mondverzorging
- Bij *Melfalan toediening en bij spoelen de patiënt ijs in de mond geven.
- Melfalan is onverenigbaar met glucose-oplossingen
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 2 dagen na de laatste gift Melfalan worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen t.b.v. vochtbalans
- dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.
- Tijd transplantatie staat vermeld in afdelingsagenda, i.p. is standaardtijd autologe transplantatie 10.30 u
- Materiaal klaarzetten voor transplantatie:
 - Dag voor TX: zuigerij (vacuüm klok, zuig- en verbindingsslang, yankauer, afzuigpot+zak) O2(O2-klok, O2-masker)
 - Dag van TX: spoedkar: intraveneus: ampul clemastine 2mg, ampul Prednisolon 25 mg, Adrenaline Sterile solution mini-jet (1mg/10ml). Opzuignaalden (2 stuks) spuiten (2 stuks), toediennaalden (3 stuks) in bekkentje klaarleggen bij de patiënt.
- Transplantatielijns zonder filter, gevuld met NaCl 0,9%. Geen bionecteur ertussen.