

In studieverband
 Buiten studieverband

BV-DHAP (Transplant Brave studie) phase II
Brentuximab Vedotin
Dexamethason-Cisplatin-Cytarabine
(Cyclus 1,2 en 3 omcirkelen welke cyclus het betreft)

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	Pat.studienr:
	Code kuur E2↓ <input type="checkbox"/>	339966E	chemo-immuno	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: Recidief Hodgkin lymfoom Cyclusduur: 21 dagen Totaal: 3 Bron: Transplant Brave Studieprotocol versie 2, 25 sept 2015 www.hematologiegroningen.nl	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp-stand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	Dag 1	08.00	Dexamethason	p.o.	40mg		**	**
		08.30	Clemastine (Tavegil)	i.v.	2mg		**	**
		08.30	Paracetamol	p.o.	1000mg		**	**
		09:00-09:30	BRENTUXIMAB Vedotin 1,8mg/kg in 100 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 30min. Let op aanvragen op studie recept!	i.v.	mg (indien het gewicht > 100kg doseren op 100 kg)			
		10.00-10.00	CISPLATIN 100 mg/m ² in 1000ml NaCl 0,9% inlooptijd 24 uur	i.v.	mg			
	Dag 2	08.00	Dexamethason	p.o.	40mg		**	**
		10.30-13.30	CYTARABINE 2000 mg/m ² in 1000ml NaCl 0,9% inlooptijd 3 uur	i.v.	mg			
		22.30-01.30	CYTARABINE 2000 mg/m ²	i.v.	mg			
	Dag 3	08.00	Dexamethason	p.o.	40 mg		**	**
	Dag 4	08.00	Dexamethason	p.o.	40 mg		**	**

patiëntensticker

	Dag 5	09.00	Pegfilgrastim Niet geven indien stamcelmobilisatie, dan start Filgastrim op dag 10 (5 µg/kg /dd)	s.c.	6 mg			
--	-------	-------	--	------	------	--	--	--

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: 3l Gluc2.5%/NaCl0,45% met per 500 ml:mmol KCl (10 mmol per 500 ml)
		dag 1: Furosemide (lasix) 2 ddmg push/i.v.
		dag 1 t/m 4 Ondansetron (Zofran)2 x 8 mg/i.v.
		dag 1: Aprepitant 1dd 125 mg
		dag 2 en 3: Aprepitant 1dd 80 mg
		Vanaf dag 5: Metoclopramide 3dd 10 mg (zn).
		Vanaf dag 5: Lorazepam 4dd 0.5 mg, als sedativum <i>toevoegen</i> zn.
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		Valaciclovir (Zelitrex) 2 x 500 mg/p.o. Indien p.o niet wordt verdragen: Aciclovir 3 x 5 mg/kg/i.v.
		dag 10 cyclus 2 G-CSF 2 x 5 ug/kg voor stamcelmobilisatie
		dag 1 t/m 4: Dexamethason 1dd 40mg p.o.
		dag 1: Clemastine (Tavegil)1dd 2mg
		dag 1: Paracetamol 1 dd 1000mg
		dag 5: Pegfilgrastim 1 dd 6 mg AN

MEDISCHE INSTRUCTIES

- Perifeer infuus
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- Patiënt krijgt in principe 3 kuren BV-DHAP met een interval van 21 dagen.
- Berekening Brentuximab vedotin
Wanneer de patiënt > 100 kg weegt zou bij dosisberekening uitgegaan moeten worden van 100 kg.
- Dagelijks controle (t/m dag 4) Na,K, Mg en kreat.

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Brentuximab: Controles vooraf, 15 en 30 minuten na start toediening en 15 minuten na toediening.
Instrueer de patiënt klachten van perifere neuropathie te melden aan de arts.
Hang spoedlijn klaar met NaCl 0,9%.
Spoedset: intraveneus: ampul clemastine 2mg, ampul Prednisolon 25 mg, Adrenaline Sterile solution mini-jet (1mg/10ml). Opzuignaalden (2 stuks) spuiten (2 stuks), toediennaalden (3 stuks) in bekkentje klaarleggen bij de patiënt.
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 7 dagen na de laatste gift Cisplatin worden opgeheven;
datum:
- 2 x per daags wegen ten behoeve van vochtbalans
- dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.
- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts m.b.t. andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels)

ACHTERGRONDINFORMATIE

Brentuximab vedotin

(SGN-35, Adcetris)

- Eigenschappen: Brentuximab vedotin is een antilichaam gebonden aan een toxine (immunotoxine). Het antilichaam is gericht tegen CD 30. Na binding aan het CD30 op de tumorcel komt het toxine (vedotin) vrij om zijn werking in de cel uit te oefenen
Bijwerkingen: infusiegerelateerde reacties, tumorlysis syndroom, Stevens-Johnsonsyndroom, perifere neuropathie, pancreatitis, mogelijk pulmonale toxiciteit, pancytopenie, infecties, hyperglykemie, nier- en leverfunctiestoornissen, moeheid, diarree, misselijkheid, braken, haaruitval, huiduitslag, jeuk, spier- en gewrichtspijn.